



Dove gli altri
si fermano



GEOXE
continua!

GEOXE

La protezione
che allunga la vita
dei tuoi raccolti



syngenta®

Fungicida per il controllo della botrite dell'uva da tavola

GEOXE è un innovativo fungicida a base di fludioxonil, dotato di elevata efficacia preventiva su *Botritis cinerea* agente causale della muffa grigia su uva da tavola.



Come agisce fludioxonil

- si lega fortemente alle superfici vegetali costituendo una barriera preventiva alle infezioni
- agisce per contatto
- possiede un'elevata resistenza al dilavamento
- garantisce una prolungata persistenza di azione nei confronti dei patogeni bersaglio

Un principio attivo unico differente

Fludioxonil, unico rappresentante della famiglia chimica dei Fenilpirroli, possiede un **meccanismo d'azione totalmente differente** da quello degli altri fungicidi oggi disponibili.

Non presentando resistenza incrociata con altre classi di fungicidi, fludioxonil (GEOXE e SWITCH) costituisce uno strumento fondamentale per una corretta strategia antiresistenza per il controllo della botrite dell'uva da tavola.

Una soluzione apprezzata da tutta la filiera

GEOXE è caratterizzato da un favorevole profilo ecotossicologico, un unico principio attivo e un intervallo pre-raccolta dell'uva da tavola di **soli 7 giorni**, semplificando significativamente la composizione dei programmi di difesa della coltura e rispondendo così alle richieste della filiera e della grande distribuzione per le produzioni di uva da tavola.



GEOXE: tanti vantaggi per la migliore protezione dell'uva da tavola

- Meccanismo di azione unico e originale
- Ottima efficacia
- Garanzia di qualità ed elevate produzioni
- Formulato contenente un solo principio attivo
- Apprezzato dagli operatori della filiera
- Flessibilità di posizionamento
- Strumento di prevenzione e gestione delle resistenze



Dosi e modalità di impiego di GEOXE per il controllo della botrite dell'uva da tavola



* Effettuare al massimo 2 applicazioni di GEOXE all'anno.

Colture	Patogeni	Dose (kg/ha)	Dose (g/hl)	Epoche di impiego	Intervallo di sicurezza
Uva da tavola	Botrite (<i>Botritis cinerea</i>)	1	100	Un trattamento entro pre-chiusura grappolo e un trattamento all'invaiaura o in pre raccolta. Effettuare massimo 2 interventi	7 gg



COMPOSIZIONE

Fludioxonil 50%

FORMULAZIONE

Granuli idrodispersibili

CONFEZIONI - IMBALLI

Scatole da 500 g in cartoni da 12 pezzi

Scatole da 1 kg in cartoni da 10 pezzi

INDICAZIONI DI PERICOLO

ATTENZIONE



REGISTRAZIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

N° 14699 del 28.10.2011

COLTURE

Melo, pero, vite da vino, vite da tavola, fragola, pomodoro, peperone, cucurbitacee, pisello, taccola, fagiolino, lattughe e insalate, spinacio, erbe fresche



syngenta®

Syngenta Italia S.p.A.

Via Gallarate, 139
20151 Milano

www.syngenta.it