

FORCE® 20 CS

Sospensione di capsule
Insetticida per la concia industriale delle sementi di barbabietola da zucchero e mais

Composizione

100 g di prodotto contengono:
teflutrin puro g 18,9 (200 g/litro)
coformulanti q.b. a g 100
Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H332 Nocivo se inalato. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P304 + P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P333 + 313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.

Viale Fulvio Testi 280/6 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Registrazione Ministero della Salute n. 11774 del 10.10.2005

Stabilimento di produzione:

Syngenta Chemicals B.V., Seneffe (Belgio)

Stabilimento di confezionamento:

Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)

Stabilimenti di rietichettatura:

ANRIV S.r.l. - Ferrara (FE) - Italia

Sinteco Logistics Sp.A. - S. Giuliano Milanese (MI) – Italia

Contenuto netto: litri 1 - 5 - 20 - 200 - 500 - 1000

Partita n. vedi corpo della confezione

Prescrizioni supplementari

La copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di escludere il rilascio di nubi di polveri durante l'immagazzinamento, il trasporto e l'applicazione.

Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale durante le fasi di trattamento dei semi e durante la manipolazione delle sementi. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

SPe 2 Per proteggere gli organismi acquatici i semi devono essere incorporati nel terreno alla profondità minima di 3 cm per il mais e di 2.5 cm per la barbabietola da zucchero.

SPe 5 Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici i semi devono essere interamente incorporati nel terreno; assicurarsi che i semi siano completamente incorporati anche all'estremità dell'appezzamento.

SPe 6 Per proteggere gli uccelli e i mammiferi selvatici recuperare i semi fuoriusciti accidentalmente.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: bloccano la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Effetti di parestesia per contatto con la pelle (prurito, formicolio, bruciore o intorpidimento) sono transitori, della durata fino a 24 ore.

Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico.

Terapia: sintomatica e di rianimazione.

Consultare un Centro AntiveleNI.

Caratteristiche

FORCE 20 CS è un insetticida, ad ampio spettro, che agisce per contatto e per ingestione.

FORCE 20 CS è indicato per controllare numerosi insetti terricoli. La sostanza attiva teflutrin possiede una prolungata persistenza; ciò fa sì che l'applicazione in concia consenta di proteggere dagli insetti terricoli, per un periodo sufficientemente lungo, sia il seme che la pianta che si sviluppa.

Dosi e modalità di impiego:

COLTURA	PARASSITA	DOSE
Barbabietola da zucchero	Elateridi (<i>Agriotes spp.</i>), Altica (<i>Chaetocnema tibialis</i>), Atomaria (<i>Atomaria linearis</i>), Millepiedi (<i>Blanululus guttulatus</i> , <i>Scutigera immaculata</i>)	60 ml/unità di seme (100.000 semi)

COLTURA	PARASSITA	DOSE
Mais	Elateridi (<i>Agriotes spp.</i>)	25 ml/unità di seme (25.000 semi)

FORCE 20 CS è indicato per tutti i tipi di attrezzature utilizzate per il trattamento delle sementi.

Per un'ottimale concia, introdurre nella vasca di preparazione il volume di acqua necessario (secondo la quantità di semente da trattare e il volume di miscela prescelto - normalmente 0,5-1% in peso delle sementi). Rimiscolare il tutto; quando la miscela risulta omogenea, il trattamento può avere inizio.

Attenzione: In caso di miscela con altri concianti accertare precedentemente la compatibilità.

In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da 200, 500 e 1000 L deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Da utilizzare solo in impianti per la concia industriale delle sementi dotati di sistemi chiusi o di aspirazione localizzata.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16/06/2021 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 4.12.2021