

**AMADEUS® TOP****Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo****Granuli idrodispersibili****MECCANISMO D'AZIONE: HRAC B****AMADEUS TOP** Registrazione Ministero della Salute n. 15674 del 14/01/2013**COMPOSIZIONE**

100 grammi di prodotto contengono:

**Tifensulfuron metile puro g 50****Tribenuron metile puro g 25****Coformulanti q. b. a g 100****Nufarm Italia S.r.l.**

Viale Luigi Majno 17/A Milano. Sede amm.va Via Guelfa, 5 Bologna

Tel. 051 0394022

Distribuito da:

**Syngenta Italia S.p.A.**, Viale Fulvio Testi, 280/6 – MILANO**ATTENZIONE****INDICAZIONI DI PERICOLO:** H373 – Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.**PREVENZIONE:** P260 – Non respirare i vapori. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.**REAZIONE:** P314 – In caso di malessere, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.**CONSERVAZIONE:** P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.**SMALTIMENTO:** P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH208 Contiene Tribenuron metile. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Stabilimenti di produzione:

**Schirm GmbH** - Lubeck (Germania)**Schirm GmbH, c/o Lehnkering GmbH** - Wolfenbüttel (Germania)**Chemark Kft.** – Peremarton gyártelep (Ungheria)**IPT Pergande** – 06369 Sudliches Anhalt (Germania)**Torre S.r.l.** – Torrenieri (SI)**Cheminova India Ltd.** - Panoli, Gujarat (India)**Alchimex SA** – Bucaresti (Romania)**Exwold Technology Ltd.** – Hartlepool (UK)**Contenuto netto: g 50-60-100-120-250****PARTITA N.**

© Marchio registrato Syngenta

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata.**INFORMAZIONI PER IL MEDICO****Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Tifensulfuron metile 50% e Tribenuron metile 25% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: TIFENSULFURON METILE: -****TRIBENURON METILE: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea.****Terapia: sintomatica****AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.****CARATTERISTICHE**

AMADEUS TOP è un erbicida sistemico di post-emergenza. Viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento, AMADEUS TOP blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocità d'azione.

**EPOCA DI IMPIEGO**

Il prodotto si impiega in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo contro infestanti a foglia larga.

**DOSI D'IMPIEGO:** 30-50 g/ha da distribuire con 200-400 litri d'acqua dallo stadio di tre foglie fino a quello di botticella delle colture.**È attivo su:** Adonide (*Adonis estivalis*) Aglio delle vigne (*Allium vineale*), Amaranto (*Amaranthus spp.*), Camomilla bastarda (*Anthemis cotula*), Coriandolo (*Bifora radians*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Farinello comune (*Chenopodium album*), Geranio (*Geranium dissectum*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Miagro liscio (*Myagrimum perfoliatum*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Ranuncolo (*Ranunculus acer*), Rapistro (*Rapistrum rugosum*), Romice (*Rumex spp.*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*), Veccia (*Vicia sativa*), Viola (*Viola arvensis*).**Infestanti mediamente sensibili:** Stoppione (*Cirsium spp.*), Vilucchio bianco (*Calystegia sepium*), Villucchio (*Convolvulus arvensis*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Crisantemo delle messi (*Chrysanthemum segetum*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Pettine di Venere (*Scandix pecten veneris*), Veronica (*Veronica persica*).

Per il controllo di queste infestanti si consiglia di utilizzare le dosi più elevate.

**PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA**

AMADEUS TOP, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo e non deve essere conservata in taniche o serbatoi per trattamenti successivi.

**AVVERTENZE AGRONOMICHE**

Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

**AVVERTENZE**

- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
  - a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
  - b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; aggiungere ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
  - c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
  - d) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
  - e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.
- Dopo un trattamento con AMADEUS TOP si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggiere.

**COMPATIBILITÀ****AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.**FITOTOSSICITÀ:** Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.**ATTENZIONE****Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.****NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI  
D'ACQUA**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE**

**DISPERSO NELL'AMBIENTE**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

# AMADEUS® TOP

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo

Granuli idrodispersibili

MECCANISMO D'AZIONE: HRAC B

<b>AMADEUS TOP</b> Registrazione Ministero della Salute n. 15674 del 14/01/2013	
<b>COMPOSIZIONE</b>	PARTITA N.
100 grammi di prodotto contengono:	
<b>Tifensulfuron metile puro</b> g 50	Contenuto netto:
<b>Tribenuron metile puro</b> g 25	<b>g 50-60-100</b>
<b>Coformulanti q. b. a</b> g 100	
<b>Nufarm Italia S.r.l.</b>	
Viale Luigi Majno 17/A Milano.	
Sede amm.va Via Guelfa, 5 Bologna	<b>ATTENZIONE</b>
Tel. 051 0394022	
Distribuito da: <b>Syngenta Italia S.p.A., Viale Fulvio Testi, 280/6 – MILANO</b>	
<b>INDICAZIONI DI PERICOLO:</b> H373 – Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.	
<b>CONSIGLI DI PRUDENZA:</b> P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.	
<b>PREVENZIONE:</b> P260 – Non respirare i vapori. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.	
<b>REAZIONE:</b> P314 – In caso di malessere, consultare un medico. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.	
<b>CONSERVAZIONE:</b> P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.	
<b>SMALTIMENTO:</b> P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.	
<b>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:</b> EUH208 Contiene Tribenuron metile. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.	
Stabilimenti di produzione:	
<b>Schirm GmbH</b> - Lubeck (Germania)	
<b>Schirm GmbH, c/o Lehnkering GmbH</b> - Wolfenbüttel (Germania)	
<b>Chemark Kft.</b> – Peremarton gyártelep (Ungheria)	
<b>IPT Pergande</b> – 06369 Sudliches Anhalt (Germania)	
<b>Torre S.r.l.</b> – Torrenieri (SI)	
<b>Cheminova India Ltd.</b> - Panoli, Gujarat (India)	
<b>Alchimex SA</b> – Bucuresti (Romania)	
<b>Exwold Technology Ltd.</b> – Hartlepool (UK)	

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO**  
**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**  
**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**  
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO**  
**NELL'AMBIENTE**