

L'offerta Syngenta per la carota

	Semina	Emergenza/Cotiledoni	Sviluppo foglie	Accrescimento fittone	Raccolta
DIFESA	Funghi tellurici	Tellus [®] WP			
	Alternaria Oidio			Ortiva [®] Score [®] 25EC Ortiva [®] Top _{sc}	
	Oidio			Tiovit [®] Jet	
	Elateridi	Force [®] Evo [*]			
	Afidi Nottue			KarateZeon [*] KarateZeon [®] 1.5 [*] Evure [®] Pro [*] Bemotius [®]	
	Infestanti	Domitrel [®] 400 CS		Zetrola [®]	

* Utilizzabile solo in Pieno Campo

EVURE PRO: solo afidi

Nei terreni in assenza di coltura (pre-semine/trapianto e/o di post-raccolta) è possibile utilizzare TOUCHDOWN per il controllo delle infestanti emerse.

Specialità nutrizionali

KENDAL[®]

Nutre e rinforza le piante per una crescita più sana e l'ottenimento dei migliori standard qualitativi

KENDAL[®] ROOT

Aiuta l'apparato radicale a rimanere vigoroso in ogni tipo di condizioni ostili

RADIFARM[®]

Assicura il totale attecchimento delle piantine trapiantate o rinvasate e riduce il tempo di superamento dello stress da trapianto

ACTIWAVE G[®]

Aumenta la capacità della pianta di assorbire gli elementi nutritivi e ottimizza la concimazione minerale

MC EXTRA[®]

Sostiene una crescita bilanciata della pianta, massimizzando il raccolto

LINEA BREXIL[®]

Linea di microelementi complessati

Per il posizionamento tecnico delle Specialità Nutrizionali fare riferimento alle indicazioni presenti in etichetta o contattare il referente tecnico di zona

	Prodotto	Composizione	Formulazione	Indicazione di pericolo	Intervallo di sicurezza	Numero di registrazione
FUNGICIDI	ORTIVA	Azoxystrobin 23,2% (250 g/l)	Sospensione concentrata	ATTENZIONE • 1 • 3	14 giorni	10161 del 24.9.99
	ORTIVA TOP SC	Azoxystrobin 18% (200 g/l) Difenoconazolo 11,3% (125 g/l)	Sospensione concentrata	ATTENZIONE • 3 • 1	14 giorni	16369 del 7.7.15
	SCORE 25 EC	Difenoconazolo 23,6% (250 g/l)	Concentrato emulsionabile	PERICOLO • 1 • 2 • 3	14 giorni	8801 del 6.3.96
	TELLUS WP	<i>Trichoderma asperellum</i> (ceppo ICC 012) g 2 <i>Trichoderma gamsii</i> (ceppo ICC 080) g 2 (UFC unità formanti colonie 3x10 ⁷ per grammo)	Polvere bagnabile	-	3 giorni	16527 del 26.11.15
	TIOVIT JET	Zolfo 80% (esente da selenio)	Microgranuli idrodispersibili	-	-	2923 del 11.11.78
INSETTICIDI	BEMOTIUS	Azadirachtin A 2,75%	Concentrato emulsionabile	ATTENZIONE • 3 • 1	3 giorni	18288 del 20.1.23
	EVURE PRO	Tau-fluvalinate 21,4% (240 g/l)	Emulsione acquosa	ATTENZIONE • 1	14 giorni	14210 del 6.6.08
	FORCE EVO	Teflutrin 0,5%	Microgranulare	ATTENZIONE • 1	-	17079 del 20.12.17
	KARATE ZEON	Lambda-cialotrina 9,48% (100 g/l)	Sospensione di capsule	ATTENZIONE • 3 • 1	3 giorni	10944 del 5.6.01
	KARATE ZEON 1.5	Lambda-cialotrina 1,47% (15 g/l)	Sospensione di capsule	ATTENZIONE • 1	3 giorni	12940 del 27.1.09
ERBICIDI	DOMITREL 400 CS	Pendimethalyn 34,8% (400 g/l)	Sospensione acquosa concentrata di capsule	ATTENZIONE • 2 • 1	-	17398 del 24.4.19
	TOUCHDOWN	Glifosate 27,9% (360 g/l)	Concentrato solubile	• 1	-	7919 del 16.5.90
	ZETROLA	Propaquizafop 9,6% (100 g/l)	Concentrato emulsionabile	PERICOLO • 3 • 2 • 1	30 giorni	17115 del 7.12.17
SPECIALITÀ NUTRIZIONALI	ACTIWAVE G	Aumenta la capacità della pianta di assorbire gli elementi nutritivi e ottimizza la concimazione minerale Applicazione al suolo: 50-100 Kg/ha 2-3 applicazioni dallo sviluppo vegetativo ogni 10-15 giorni	Granuli	-	-	-
	KENDAL	Aiuta le piante a rimanere vigorose in condizioni ostili di crescita e permette una resa di migliore qualità. Applicazione fogliare: 1 - 2 L/ha ogni 7-10 giorni insieme ai trattamenti con gli agrofarmaci	Liquido solubile in acqua	-	-	-
	KENDAL ROOT	Nutre e rinforza l'apparato radicale Applicazione in fertirrigazione: 5-20 L/ha in base alla gravità del danno alla radice e alla frequenza delle applicazioni: 5 L/ha in caso di danni radicali limitati o se applicato ogni 7 gg; 20 L/ha in caso di danni seri alla radice o se applicato ogni 20 gg.	Liquido solubile in acqua	-	-	-
	MC EXTRA	Per una crescita bilanciata Applicazione fogliare: 1 Kg/ha	Microgranuli solubili	-	-	-
	RADIFARM	Assicura il totale attecchimento delle piantine trapiantate o rinvasate e riduce il tempo di superamento dello stress da trapianto. Applicazione in fertirrigazione: 500 mL/1000m ² subito dopo il trapianto e dopo 7 giorni	Liquido solubile in acqua	-	-	-

Legenda pittogrammi
1 
2 
3 
4 
5 

03/2024 Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio dei preparati. © e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta.

BEMOTIUS®: registrazione Mitsui AgriScience International S.A./N.V.