

Italia

Published on *Syngenta Italia* (<http://www.syngenta.it>)

[Home](#) > FORCE EVO

---

## FORCE EVO



## FORCE EVO

Ultimo aggiornamento:

20.06.2019

### Insetticidi

#### Agrofarmaco

**Numero di registrazione:**

17079 del 20.12.17

**Composizione:**

0,5%

Teflutrin

**Formulazione:**

Granulare

FORCE EVO è un insetticida piretroide particolarmente attivo nei confronti di coleotteri, ditteri, lepidotteri e miriapodi che trascorrono parte del loro ciclo di vita nel terreno.

Il prodotto agisce per contatto e ingestione; nella fase di vapore possiede una forte attività repellente che ne aumenta l'efficacia protettiva.

Grazie alla particolare formulazione, FORCE EVO esplica un'azione stimolante del processo germinativo e facilita il superamento dello stress da trapianto.

Registrazione Diachem S.p.A.

### Product CP: Tabs

- [COLTURE, CAMPI, MODALITÀ D'IMPIEGO](#)
- [CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE](#)

Scegli la coltura

-Tutte- ▼

Apply

**1**

[Successive](#)

**Anguria**

**Asparago**

**Barbabietola da zucchero**

**Carota**

**Cavolfiore**

**Cavolo cappuccio**

**Cavolo verza**

**Cetriolo**

**Colza**

**Endivia**

**1**

[Successive](#)

**Indicazioni di  
pericolo (CLP)**

•

**ATTENZIONE**



.....

---

## **Avvertenze**

---

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

## **Accorgimenti per il corretto impiego**

---

- I coformulanti utilizzati nella formulazione di FORCE EVO contengono azoto e fosforo (10:44), manganese (3%) e zinco (2%), il cui quantitativo va tenuto in considerazione nella preparazione del piano di concimazione della coltura, al fine di evitare sovradosaggi di fertilizzanti. FORCE EVO va applicato lungo la fila al momento della semina o del trapianto con microgranulatori adeguatamente tarati tenendo in considerazione che la sua densità apparente è di 0,9 g/cm<sup>3</sup>. In previsione di attacchi parassitari che si protraggono nel tempo, in particolare nelle coltivazioni di pomodoro e melanzana, può risultare necessario effettuare il trattamento in due tempi successivi: un primo intervento alla semina/trapianto e il secondo alla sarchiatura/rincazzatura. Non impiegare in serra. Dopo l'apertura della confezione il formulato teme l'umidità essendo i componenti igroscopici.

---