

Italia

Published on *Syngenta Italia* (<http://www.syngenta.it>)

[Home](#) > GEOXE

---

## GEOXE



## GEOXE

Ultimo aggiornamento:

27.01.2020

### Fungicidi

#### Agrofarmaco

**Numero di registrazione:**

14699 del 28.10.11

**Composizione:**

50%

Fludioxonil

**Formulazione:**

Granuli Idrodisperdibili (Wg)

GEOXE è il nuovo fungicida in granuli idrodisperdibili per il controllo della maculatura bruna del pero (*Stemphylium* spp.), dell'alternaria del melo (*Alternaria* spp.) e per la prevenzione delle malattie della conservazione delle pomacee con trattamenti in pre-raccolta. GEOXE è inoltre indicato per il controllo della botrite su vite da tavola e da vino.

Video of Maculatura bruna: come difendere il pero?

### Product CP: Tabs

- [COLTURE, CAMPI, MODALITÀ D'IMPIEGO](#)
- [CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE](#)

# COLTURE, CAMPI, MODALITÀ D'IMPIEGO

## GEOXE Cetriolino

Cetriolino

### **Botrite**

<b>Dosi d'impiego</b>	<b>Numero massimo di applicazioni</b>	<b>Intervallo di sicurezza (giorni)</b>
-----------------------	---------------------------------------	---

0,5 kg/ha; 0,05 kg/hl	2 per anno	3
-----------------------	------------	---

**Epoche d'impiego :** Da inizio fioritura a sviluppo completo dei frutti

---

## GEOXE Cetriolo

Cetriolo

### **Botrite**

<b>Dosi d'impiego</b>	<b>Numero massimo di applicazioni</b>	<b>Intervallo di sicurezza (giorni)</b>
-----------------------	---------------------------------------	---

0,5 kg/ha; 0,05 kg/hl	2 per anno	3
-----------------------	------------	---

**Epoche d'impiego :** Da inizio fioritura a sviluppo completo dei frutti

---

## GEOXE Endivia

Endivia

### **Botrite**

<b>Dosi d'impiego</b>	<b>Numero massimo di applicazioni</b>	<b>Intervallo di sicurezza (giorni)</b>
-----------------------	---------------------------------------	---

0,5 kg/ha; 0,05 kg/hl	2 per anno	7
-----------------------	------------	---

**Epoche d'impiego :** Da prima foglia vera alla raccolta

---

### **Sclerotinia**

<b>Dosi d'impiego</b>	<b>Numero massimo di applicazioni</b>	<b>Intervallo di sicurezza (giorni)</b>
-----------------------	---------------------------------------	---

0,5 kg/ha; 0,05 kg/hl	2 per anno	7
-----------------------	------------	---

**Epoche d'impiego :** Da prima foglia vera alla raccolta

---

## GEOXE Erbe fresche

Erbe fresche

### **Botrite**

<b>Dosi d'impiego</b>	<b>Numero massimo di applicazioni</b>	<b>Intervallo di sicurezza (giorni)</b>
0,5 kg/ha; 0,05 kg/hl	2 per anno	7

**Epoche d'impiego :** Da prima foglia vera alla raccolta

---

### **Sclerotinia**

<b>Dosi d'impiego</b>	<b>Numero massimo di applicazioni</b>	<b>Intervallo di sicurezza (giorni)</b>
0,5 kg/ha; 0,05 kg/hl	2 per anno	7

**Epoche d'impiego :** Da prima foglia vera alla raccolta

---

## GEOXE Fagiolino

Fagiolino

### **Botrite**

<b>Dosi d'impiego</b>	<b>Numero massimo di applicazioni</b>	<b>Intervallo di sicurezza (giorni)</b>
0,75 kg/ha; 0,09 kg/hl	2 per anno	14

**Epoche d'impiego :** Da pre fioritura a sviluppo completo del baccello

---

### **Sclerotinia**

<b>Dosi d'impiego</b>	<b>Numero massimo di applicazioni</b>	<b>Intervallo di sicurezza (giorni)</b>
0,75 kg/ha; 0,09 kg/hl	2 per anno	14

**Epoche d'impiego :** Da pre fioritura a sviluppo completo del baccello

---

## GEOXE Fragola

Fragola

### **Botrite**

<b>Dosi d'impiego</b>	<b>Numero massimo di applicazioni</b>	<b>Intervallo di sicurezza (giorni)</b>
0,5 kg/ha; 0,05 kg/hl	2 per anno	3
<b>Epoche d'impiego :</b> Da inizio fioritura alla raccolta		

---

## **GEOXE Lattuga**

Lattuga

### **Botrite**

<b>Dosi d'impiego</b>	<b>Numero massimo di applicazioni</b>	<b>Intervallo di sicurezza (giorni)</b>
0,5 kg/ha; 0,05 kg/hl	2 per anno	7
<b>Epoche d'impiego :</b> Da prima foglia vera alla raccolta		

---

### **Sclerotinia**

<b>Dosi d'impiego</b>	<b>Numero massimo di applicazioni</b>	<b>Intervallo di sicurezza (giorni)</b>
0,5 kg/ha; 0,05 kg/hl	2 per anno	7
<b>Epoche d'impiego :</b> Da prima foglia vera alla raccolta		

---

## **GEOXE Melo**

Melo

### **Maculatura bruna o Alternariosi**

<b>Dosi d'impiego</b>	<b>Intervallo di sicurezza (giorni)</b>
0,45 kg/Ha; 30 g/hl	3
<b>Epoche d'impiego :</b> Da frutto noce a pre-raccolta	

---

### **Marciume lenticellare**

<b>Dosi d'impiego</b>	<b>Intervallo di sicurezza (giorni)</b>
0,45 kg/Ha; 30 g/hl	3
<b>Epoche d'impiego :</b> Da frutto noce a pre-raccolta	

---

### **Marciume verde-azzurro**

<b>Dosi d'impiego</b>	<b>Intervallo di sicurezza (giorni)</b>
0,45 kg/Ha; 30 g/hl	3

**Epoche d'impiego :** Da frutto noce a pre-raccolta

---

## Muffa grigia e marciume fogliare

**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,45 kg/Ha; 30 g/hl 3

**Epoche d'impiego :** Da frutto noce a pre-raccolta

---

## GEOXE Peperone

Peperone

### Botrite

**Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 kg/ha; 0,05 kg/hl 2 per anno

3

**Epoche d'impiego :** Da prefioritura alla raccolta

---

## GEOXE Pero

Pero

### Maculatura bruna o Alternariosi

**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,45 kg/Ha; 30 g/hl 3

**Epoche d'impiego :** Da frutto noce a pre-raccolta

---

### Marciume lenticellare

**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,45 kg/Ha; 30 g/hl 3

**Epoche d'impiego :** Da frutto noce a pre-raccolta

---

### Marciume verde-azzurro

**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,45 kg/Ha; 30 g/hl 3

**Epoche d'impiego :** Da frutto noce a pre-raccolta

---

## Muffa grigia e marciume fogliare

**Dosi d'impiego**    **Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,45 kg/Ha; 30 g/hl    3

**Epoche d'impiego :**    Da frutto noce a pre-raccolta

---

## GEOXE Pisello fresco senza baccello

Pisello fresco senza baccello

### Botrite

**Dosi d'impiego**                      **Numero massimo di applicazioni**                      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,75 kg/ha; 0,09 kg/hl    2 per anno                      14

**Epoche d'impiego :**    Da pre fioritura a sviluppo completo del baccello

---

### Sclerotinia

**Dosi d'impiego**                      **Numero massimo di applicazioni**                      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,75 kg/ha; 0,09 kg/hl    2 per anno                      14

**Epoche d'impiego :**    Da pre fioritura a sviluppo completo del baccello

---

## GEOXE Pomodoro da industria

Pomodoro da industria

### Botrite

**Dosi d'impiego**                      **Numero massimo di applicazioni**                      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 kg/ha; 0,05 kg/hl    2 per anno                      3

**Epoche d'impiego :**    Da fioritura alla raccolta

---

## GEOXE Pomodoro da mercato fresco

Pomodoro da mercato fresco

### Botrite

<b>Dosi d'impiego</b>	<b>Numero massimo di applicazioni</b>	<b>Intervallo di sicurezza (giorni)</b>
0,5 kg/ha; 0,05 kg/hl	2 per anno	3

**Epoche d'impiego :** Da fioritura alla raccolta

---

## **GEOXE Radicchio**

Radicchio

### **Botrite**

**Dosi d'impiego** **Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 kg/ha; 50 g/hl 7

**Epoche d'impiego :** Massimo 2 trattamenti da prima foglia vera alla raccolta

---

### **Sclerotinia**

**Dosi d'impiego** **Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 kg/ha; 50 g/hl 7

**Epoche d'impiego :** Massimo 2 trattamenti da prima foglia vera alla raccolta

---

## **GEOXE Rucola**

Rucola

### **Botrite**

**Dosi d'impiego** **Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 kg/ha; 50 g/hl 7

**Epoche d'impiego :** Massimo 2 trattamenti da prima foglia vera alla raccolta

---

### **Sclerotinia**

**Dosi d'impiego** **Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 kg/ha; 50 g/hl 7

**Epoche d'impiego :** Massimo 2 trattamenti da prima foglia vera alla raccolta

---

## **GEOXE Spinacio**

Spinacio

## Botrite

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
0,5 kg/ha; 0,05 kg/hl	2 per anno	7

**Epoche d'impiego :** Da prima foglia vera alla raccolta

---

## Sclerotinia

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
0,5 kg/ha; 0,05 kg/hl	2 per anno	7

**Epoche d'impiego :** Da prima foglia vera alla raccolta

---

## GEOXE Taccola

Taccola

### Botrite

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
0,75 kg/ha; 0,09 kg/hl	2 per anno	14

**Epoche d'impiego :** Da pre fioritura a sviluppo completo del baccello

---

### Sclerotinia

Dosi d'impiego	Numero massimo di applicazioni	Intervallo di sicurezza (giorni)
0,75 kg/ha; 0,09 kg/hl	2 per anno	14

**Epoche d'impiego :** Da pre fioritura a sviluppo completo del baccello

---

## GEOXE Vite da vino

Vite da vino

### Muffa grigia e marciume fogliare

Dosi d'impiego	Intervallo di sicurezza (giorni)
0,8-1 kg/Ha	21

**Epoche d'impiego :** Un trattamento entro pre-chiusura grappolo e un trattamento all'invaiaatura o in pre-raccolta. Effettuare al massimo 2 interventi

---



## GEOXE Vite per uva da tavola

Vite per uva da tavola

### **Muffa grigia e marciume fogliare**

#### **Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1 kg/Ha 7

**Epoche d'impiego :** Un trattamento entro pre-chiusura grappolo e un trattamento all'invasatura o in pre-raccolta. Effettuare al massimo 2 interventi

---

## GEOXE Zucchini

Zucchini

### **Botrite**

#### **Dosi d'impiego Numero massimo di applicazioni Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,5 kg/ha; 0,05 kg/hl 2 per anno 3

**Epoche d'impiego :** Da inizio fioritura a sviluppo completo dei frutti

---

## CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE

### **Indicazioni di pericolo (CLP)**

•

**ATTENZIONE**



\*\*\*\*\*

### **Avvertenze**

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

### **Accorgimenti per il corretto impiego**

• Rispettare la dose per ettaro di GEOXE indipendentemente dal volume di bagnatura utilizzato.

---