

## SWITCH



## SWITCH

Ultimo aggiornamento:

24.01.2020

### Fungicidi

#### Agrofarmaco

**Numero di registrazione:**

9578 del 2.4.98

**Composizione:**

37,5%

Cyprodinil

25%

Fludioxonil

**Formulazione:**

Granuli Idrodispersibili (Wg)

SWITCH è un fungicida particolarmente efficace nei confronti della Muffa grigia e di altri marciumi di numerose colture. In viticoltura è registrato anche per il controllo dei marciumi secondari del grappolo (*Aspergillus* spp. e *Penicillium* spp.). Grazie all'associazione complementare e sinergica di Fludioxonil (fenilpirrolo) e Cyprodinil (anilinopirimidina), si distingue per livello di efficacia e durata della protezione, anche nei confronti di popolazioni di funghi resistenti o solo parzialmente sensibili ad altri fungicidi in commercio. SWITCH è selettivo nei confronti dei più comuni ed importanti insetti ed acari utili. SWITCH non influenza la maturazione delle uve, i processi di fermentazione e di vinificazione e le qualità organolettiche dei vini.

Video of Come proteggere la vite da botrite in epoca pre-chiusura grappolo

### Product CP: Tabs

- [COLTURE, CAMPI, MODALITÀ D'IMPIEGO](#)

- **CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE**

## **COLTURE, CAMPI, MODALITÀ D'IMPIEGO**

### **SWITCH Aglio**

Aglio

#### **Muffa grigia**

**Dosi d'impiego**      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

80 - 100 g/hl; 1 kg/ha    21

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni.

---

### **SWITCH Albicocco**

Albicocco

#### **Monilia**

**Dosi d'impiego**      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

30-60 g/hl ; 0,3-1 kg/ha    7

**Epoche d'impiego :** Effettuare 1 trattamento ad inizio fioritura ed 1 trattamento a caduta petali. 1-2 trattamenti in pre-raccolta

---

### **SWITCH Basilico**

Basilico

#### **Marciume del colletto**

**Dosi d'impiego**      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50 - 70 g/hl; 0,6 kg/ha    7

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni.

---

#### **Muffa grigia**

**Dosi d'impiego**      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50 - 70 g/hl; 0,6 kg/ha 7

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni.

---

## **SWITCH Cetriolo**

Cetriolo

**Muffa grigia e marciume fogliare****Dosi d'impiego**      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

60-80 ml/hl ; 0,6-0,8 kg/ha 3

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti

---

## **SWITCH Cicoria**

Cicoria

**Marciume del colletto (Sclerotinia major)****Dosi d'impiego**      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-70 g/hl ; 0,5-0,7 kg/ha 14

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

---

**Muffa grigia e marciume fogliare****Dosi d'impiego**      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-70 g/hl ; 0,5-0,7 kg/ha 14

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

---

## **SWITCH Ciliegio**

Ciliegio

**Monilia**

**Dosi d'impiego**      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

30-60 g/hl ; 0,3-1 kg/ha 7

**Epoche d'impiego :** Effettuare 1 trattamento ad inizio fioritura ed 1 trattamento a caduta petali. 1-2 trattamenti in pre-raccolta

## **SWITCH Cipolla**

Cipolla

### **Botrite della Cipolla**

**Dosi d'impiego**      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

80-100 g/hl ; 0,8-1 kg/ha 7

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

### **Muffa grigia e marciume fogliare**

**Dosi d'impiego**      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

80-100 g/hl ; 0,8-1 kg/ha 7

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

## **SWITCH Crescione**

Crescione

### **Marciume del colletto (Sclerotinia major)**

**Dosi d'impiego**      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-70 g/hl ; 0,5-0,7 kg/ha 14

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

### **Muffa grigia e marciume fogliare**

**Dosi d'impiego**      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-70 g/hl ; 0,5-0,7 kg/ha 14

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

## **SWITCH Dolcetta o valerianella**

Dolcetta o valerianella

### **Marciume del colletto (Sclerotinia major)**

**Dosi d'impiego**      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha    7

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

---

### **Muffa grigia e marciume fogliare**

**Dosi d'impiego**      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha    7

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

---

## **SWITCH Endivia**

Endivia

### **Marciume del colletto (Sclerotinia major)**

**Dosi d'impiego**      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha    7

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

---

### **Muffa grigia e marciume fogliare**

**Dosi d'impiego**      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha    7

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

---

## **SWITCH Erbe fresche**

Erbe fresche

### **Marciume del colletto (Sclerotinia major)**

**Dosi d'impiego      Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha    7

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni**Muffa grigia e marciume fogliare****Dosi d'impiego      Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha    7

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

## **SWITCH Fagiolino**

Fagiolino

**Antracnosi****Dosi d'impiego      Intervallo di sicurezza (giorni)**

1 kg/ha                      14

**Epoche d'impiego :** Effettuare un massimo di 2 trattamenti per stagione a cadenza di 10-14 giorni.**Muffa grigia****Dosi d'impiego      Intervallo di sicurezza (giorni)**

1 kg/ha                      14

**Epoche d'impiego :** Effettuare un massimo di 2 trattamenti per stagione a cadenza di 10-14 giorni.**Sclerotinia****Dosi d'impiego      Intervallo di sicurezza (giorni)**

1 kg/ha                      14

**Epoche d'impiego :** Effettuare un massimo di 2 trattamenti per stagione a cadenza di 10-14 giorni.

## **SWITCH Fagiolo**

Fagiolo

### **Antracnosi**

#### **Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1 kg/ha 14

**Epoche d'impiego :** Effettuare un massimo di 2 trattamenti per stagione a cadenza di 10-14 giorni.

---

### **Muffa grigia**

#### **Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1 kg/ha 14

**Epoche d'impiego :** Effettuare un massimo di 2 trattamenti per stagione a cadenza di 10-14 giorni.

---

### **Sclerotinia**

#### **Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1 kg/ha 14

**Epoche d'impiego :** Effettuare un massimo di 2 trattamenti per stagione a cadenza di 10-14 giorni.

---

## **SWITCH Finocchio**

Finocchio

### **Marciumi da Sclerotinia**

#### **Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

60-80 g/hl ; 0,6-0,8 kg/ha 7

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti la malattia. Effettuare un massimo di 2 trattamenti per stagione a cadenza di 10-14 giorni

---

### **Muffa grigia e marciume fogliare**

#### **Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

60-80 g/hl ; 0,6-0,8 kg/ha 7

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti la

malattia. Effettuare un massimo di 2 trattamenti per stagione a cadenza di 10-14 giorni

---

## **SWITCH Floricole**

Floricole

### **Marciumi da Botrytis**

**Dosi d'impiego      Intervallo di sicurezza (giorni)**

80 g/hl ; 0,8-1 kg/ha -

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 interventi

---

## **SWITCH Florovivaismo**

Florovivaismo

### **Marciumi da Botrytis**

**Dosi d'impiego      Intervallo di sicurezza (giorni)**

80 g/hl ; 0,8-1 kg/ha -

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 interventi

---

## **SWITCH Fragola**

Fragola

### **Muffa grigia e marciume fogliare**

**Dosi d'impiego      Intervallo di sicurezza (giorni)**

80 g/hl ; 0,8 kg/ha 2 (campo), 1 (serra)

**Epoche d'impiego :** Effettuare 2-3 trattamenti nelle fasi: inizio fioritura, fine fioritura ed ingrossamento dei primi frutti

---

## **SWITCH Lattuga**

Lattuga



## Marciume del colletto (*Sclerotinia major*)

**Dosi d'impiego**      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha 7

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

---

## Muffa grigia e marciume fogliare

**Dosi d'impiego**      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha 7

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

---

## SWITCH Melanzana

Melanzana

### Muffa grigia e marciume fogliare

**Dosi d'impiego**      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

60-80 ml/hl ; 0,6-0,8 kg/ha 3

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti

---

## SWITCH Ornamentali

Ornamentali

### Marciumi da *Botrytis*

**Dosi d'impiego**      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

80 g/hl ; 0,8-1 kg/ha -

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 interventi

---

## SWITCH Peperone

Peperone

### **Muffa grigia e marciume fogliare**

**Dosi d'impiego**                      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

60-80 ml/hl ; 0,6-0,8 kg/ha    3

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti

---

## SWITCH Pero

Pero

### **Maculatura bruna o Alternariosi**

**Dosi d'impiego**                      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

60-80 g/hl ; 0,8-1 kg/ha    3

**Epoche d'impiego :** Da allegagione ad intervalli di 8-10 giorni e in pre-raccolta contro il marciume dei frutti. Effettuare al massimo 3 trattamenti per stagione

---

## SWITCH Pesco

Pesco

### **Monilia**

**Dosi d'impiego**                      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

30-60 g/hl ; 0,3-1 kg/ha    7

**Epoche d'impiego :** Effettuare 1 trattamento ad inizio fioritura ed 1 trattamento a caduta petali. 1-2 trattamenti in pre-raccolta

---

## SWITCH Pomodoro da industria

Pomodoro da industria

### **Muffa grigia e marciume fogliare**

**Dosi d'impiego**                      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

60-80 ml/hl ; 0,6-0,8 kg/ha    3

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti

---

## **SWITCH Pomodoro da mercato fresco**

Pomodoro da mercato fresco

### **Muffa grigia e marciume fogliare**

**Dosi d'impiego**                      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

60-80 ml/hl ; 0,6-0,8 kg/ha    3

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti

---

## **SWITCH Radicchio**

Radicchio

### **Marciume del colletto (Sclerotinia major)**

**Dosi d'impiego**                      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha    7

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

---

### **Muffa grigia e marciume fogliare**

**Dosi d'impiego**                      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha    7

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

---

## **SWITCH Rucola**

Rucola

### **Marciume del colletto (Sclerotinia major)**

**Dosi d'impiego**      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha 7

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

---

**Muffa grigia e marciume fogliare**

**Dosi d'impiego**      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha 7

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

---

**SWITCH Scarola**

Scarola

**Marciume del colletto (Sclerotinia major)**

**Dosi d'impiego**      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha 7

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

---

**Muffa grigia e marciume fogliare**

**Dosi d'impiego**      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha 7

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

---

**SWITCH Susino**

Susino

**Monilia**

**Dosi d'impiego**      **Intervallo di sicurezza (giorni)**

30-60 g/hl ; 0,3-1 kg/ha 7

**Epoche d'impiego :** Effettuare 1 trattamento ad inizio fioritura ed 1 trattamento a caduta petali. 1-2 trattamenti in pre-raccolta

---

## SWITCH Tabacco

Tabacco

### Alternaria

**Dosi d'impiego**    **Intervallo di sicurezza (giorni)**

80 g/hl ; 0,8-1 kg/ha -

**Epoche d'impiego :** -

---

## SWITCH Vite da vino

Vite da vino

### Marciumi secondari della Vite

**Dosi d'impiego**    **Intervallo di sicurezza (giorni)**

80 g/hl ; 0,8 kg/ha 21

**Epoche d'impiego :** 1 trattamento entro pre-chiusura grappolo e 1 trattamento all'invaiaatura o in pre-raccolta. Effettuare un massimo di 2 interventi

---

### Muffa grigia e marciume fogliare

**Dosi d'impiego**    **Intervallo di sicurezza (giorni)**

80 g/hl ; 0,8 kg/ha 21

**Epoche d'impiego :** 1 trattamento entro pre-chiusura grappolo e 1 trattamento all'invaiaatura o in pre-raccolta. Effettuare un massimo di 2 interventi

---

## SWITCH Vite per uva da tavola

Vite per uva da tavola

### Marciumi secondari della Vite

**Dosi d'impiego**    **Intervallo di sicurezza (giorni)**

80 g/hl ; 0,8 kg/ha 7

**Epoche d'impiego :** 1 trattamento entro pre-chiusura grappolo e 1 trattamento all'invaiaatura o in pre-raccolta. Effettuare un massimo di 2 interventi

---

### Muffa grigia e marciume fogliare

**Dosi d'impiego    Intervallo di sicurezza (giorni)**

80 g/hl ; 0,8 kg/ha    7

**Epoche d'impiego :** 1 trattamento entro pre-chiusura grappolo e 1 trattamento all'invasatura o in pre-raccolta. Effettuare un massimo di 2 interventi

## **SWITCH Zucchini**

Zucchini

**Muffa grigia e marciume fogliare****Dosi d'impiego                      Intervallo di sicurezza (giorni)**

60-80 ml/hl ; 0,6-0,8 kg/ha    3

**Epoche d'impiego :** Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti

## **CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE**

**Indicazioni di pericolo (CLP)**•  
**ATTENZIONE****Avvertenze**.....  
Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.**Accorgimenti per il corretto impiego**

- Bagnare accuratamente la vegetazione e i frutti. Con attrezzature a basso ed ultra basso volume rispettare la dose consigliata per ettaro. Il prodotto è miscibile con i fungicidi e gli insetticidi di più comune impiego. Utilizzare SWITCH ad almeno 20 metri da corpi idrici.