

## PERGADO D



## PERGADO D

Ultimo aggiornamento:

29.07.2020

### Fungicidi

#### Agrofarmaco

**Numero di registrazione:**

16296 del 18.04.2017

**Composizione:**

62,5 g/L (5,59%)

Mandipropamid

250 g/L (22,3%)

Dithianon

Famiglia chimica

CAA

**Formulazione:**

Sospensione Concentrata (Sc)

PERGADO D è lo specialista degli interventi antiperonosporici in pre-fioritura, nel periodo di pieno sviluppo vegetativo della coltura.

Il prodotto è in formulazione pronta a base di mandipropamid e dithianon in sospensione concentrata. Grazie alla combinazione delle due sostanze attive, PERGADO D fornisce una solida soluzione per la difesa antiperonosporica, fin dall'inizio della stagione. Assicura una notevole resistenza al dilavamento, una lunga durata d'azione e una robusta strategia antiresistenza.

PERGADO D ha inoltre un intervallo tra i trattamenti molto elastico, da 8 a 12 giorni.

### Product CP: Tabs

- [COLTURE, CAMPI, MODALITÀ D'IMPIEGO](#)

## • **CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE**

Scegli la coltura

-Tutte- ▼

Apply

### **Vite da vino**

#### **Indicazioni di pericolo (CLP)**



---

#### **Avvertenze**

••

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

---

#### **Accorgimenti per il corretto impiego**

- Iniziare i trattamenti quando si verificano le condizioni predisponenti all'insorgenza della malattia. Il prodotto è consigliato per applicazioni preventive. Si consiglia di utilizzare PERGADO D in programmi di difesa in alternanza alla linea di prodotti RIDOMIL GOLD. In questo modo si ottiene un elevato livello di protezione dalla Peronospora durante le fasi di maggiore suscettibilità delle colture e si previene l'insorgenza di fenomeni di resistenza. Si consiglia di effettuare saggi preliminari su superfici ridotte prima di estendere il trattamento ad aree più vaste nei seguenti casi: varietà poco diffuse o di recente introduzione, trattamenti post-fiorali.

---