

Italia

Published on *Syngenta Italia* (<https://www.syngenta.it>)

[Home](#) > AMPLIGO

AMPLIGO



AMPLIGO

Ultimo aggiornamento:

20.06.2019

Insetticidi

Agrofarmaco

Numero di registrazione:

14936 del 27.6.11

Composizione:

9,26% (100g/l)

Chlorantraniliprole

4,63% (50 g/l)

Lambda-cialotrina

Formulazione:

Miscela Di Sospensione Di Capsule E Sospensione Concentrata

AMPLIGO è un nuovo insetticida ad ampio spettro di azione, dotato di rapido potere abbattente e lunga durata di azione sui parassiti. AMPLIGO è la soluzione completa e flessibile per il controllo di lepidotteri.

Product CP: Tabs

- [COLTURE, CAMPI, MODALITÀ D'IMPIEGO](#)
- [CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE](#)

[COLTURE, CAMPI, MODALITÀ D'IMPIEGO](#)

AMPLIGO Carciofo

Carciofo

Afidi

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,3 3

Chrysodeixis chalcites

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,3 l/Ha 3

Spodoptera exigua

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,3 l/ha 3

Spodoptera littoralis

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,3 l/Ha 3

AMPLIGO Cavolo broccolo

Cavolo broccolo

Afidi

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4 l/Ha 3

Cavolaia

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4 l/Ha 3

Epocche d'impiego : Lepidotteri: applicare AMPLIGO durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari. Tuta assoluta e cavoli: aggiungere 0,2-0,3 l/ha di BREAK-THRU S 240 e assicurare la

completa bagnatura delle vegetazione

Spodoptera

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4 l/Ha	3
----------	---

Epoche d'impiego : Lepidotteri: applicare AMPLIGO durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari. Tuta assoluta e cavoli: aggiungere 0,2-0,3 l/ha di BREAK-THRU S 240 e assicurare la completa bagnatura delle vegetazione

Tignola delle Crucifere

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4 l/Ha	3
----------	---

Epoche d'impiego : Lepidotteri: applicare AMPLIGO durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari. Tuta assoluta e cavoli: aggiungere 0,2-0,3 l/ha di BREAK-THRU S 240 e assicurare la completa bagnatura delle vegetazione

AMPLIGO Lattuga

Lattuga

Afidi

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,15 l/Ha	14
-----------	----

AMPLIGO Mais

Mais

Diabrotica

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,3 l/Ha	14
----------	----

Epoche d'impiego : Applicare durante la fase di ovideposizione. Se necessario ripetere il trattamento dopo 7 giorni.

Nottue

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,3 l/Ha	14
----------	----

Epoche d'impiego : Lepidotteri: applicare AMPLIGO durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari. Se necessario ripetere il trattamento dopo 7 giorni.

Piralide del Mais**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,3 l/Ha	14
----------	----

Epoche d'impiego : Lepidotteri: applicare AMPLIGO durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari. Se necessario ripetere il trattamento dopo 7 giorni.

AMPLIGO Mais dolce

Mais dolce

Diabrotica**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,3 l/Ha	14
----------	----

Epoche d'impiego : Applicare durante la fase di ovideposizione. Se necessario ripetere il trattamento dopo 7 giorni.

Nottue**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,3 l/Ha	14
----------	----

Epoche d'impiego : Lepidotteri: applicare AMPLIGO durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari. Se necessario ripetere il trattamento dopo 7 giorni.

Piralide del Mais**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,3 l/Ha	14
----------	----

Epoche d'impiego : Lepidotteri: applicare AMPLIGO durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari. Se necessario ripetere il trattamento dopo 7 giorni.

AMPLIGO Patata

Patata

Leptinotarsa decemlineata

Dosi d'impiego	Intervallo di sicurezza (giorni)
-----------------------	---

0,3 l/Ha	14
----------	----

Epoche d'impiego : Applicare alla comparsa dei primi adulti o al raggiungimento della soglia di intervento. Se necessario, ripetere il trattamento dopo 8-10 giorni

Phthorimae operculella

Dosi d'impiego	Intervallo di sicurezza (giorni)
-----------------------	---

0,3 l/ha	14
----------	----

AMPLIGO Pomodoro da industria

Pomodoro da industria

Afidi

Dosi d'impiego	Intervallo di sicurezza (giorni)
-----------------------	---

0,4 l/Ha	3
----------	---

Fillominatrice del pomodoro

Dosi d'impiego	Intervallo di sicurezza (giorni)
-----------------------	---

0,4 l/Ha	3
----------	---

Epoche d'impiego : Lepidotteri: applicare AMPLIGO durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari. Tuta assoluta e cavoli: aggiungere 0,2-0,3 l/ha di BREAK-THRU S 240 e assicurare la completa bagnatura delle vegetazione

Nottue gialle

Dosi d'impiego	Intervallo di sicurezza (giorni)
-----------------------	---

0,4 l/Ha	3
----------	---

Epoche d'impiego : Lepidotteri: applicare AMPLIGO durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari. Tuta assoluta e cavoli: aggiungere 0,2-0,3 l/ha di BREAK-THRU S 240 e assicurare la completa bagnatura delle vegetazione

Spodoptera

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4 l/Ha	3
----------	---

Epoche d'impiego : Lepidotteri: applicare AMPLIGO durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari. Tuta assoluta e cavoli: aggiungere 0,2-0,3 l/ha di BREAK-THRU S 240 e assicurare la completa bagnatura delle vegetazione

AMPLIGO Pomodoro da mercato fresco

Pomodoro da mercato fresco

Afidi

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4 l/Ha	3
----------	---

Fillominatrice del pomodoro

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4 l/Ha	3
----------	---

Epoche d'impiego : Lepidotteri: applicare AMPLIGO durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari. Tuta assoluta e cavoli: aggiungere 0,2-0,3 l/ha di BREAK-THRU S 240 e assicurare la completa bagnatura delle vegetazione

Nottue gialle

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4 l/Ha	3
----------	---

Epoche d'impiego : Lepidotteri: applicare AMPLIGO durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari. Tuta assoluta e cavoli: aggiungere 0,2-0,3 l/ha di BREAK-THRU S 240 e assicurare la completa bagnatura delle vegetazione

Spodoptera

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4 l/Ha	3
----------	---

Epoche d'impiego : Lepidotteri: applicare AMPLIGO durante la fase di ovideposizione o alla

comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari. Tuta assoluta e cavoli: aggiungere 0,2-0,3 l/ha di BREAK-THRU S 240 e assicurare la completa bagnatura delle vegetazione

CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE

Indicazioni di pericolo (CLP)

•

ATTENZIONE



Avvertenze

.....

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

Accorgimenti per il corretto impiego

- Si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro di AMPLIGO indicate in tabella per ciascuna coltura, indipendentemente dai volumi di acqua impiegati per la distribuzione. Non impiegare in serra.
