

Italia

Published on *Syngenta Italia* (<https://www.syngenta.it>)

[Home](#) > ETRAVON PRO

---

## ETRAVON PRO

---



## ETRAVON PRO

Ultimo aggiornamento:

25.06.2019

### Coadiuvanti

#### Agrofarmaco

**Numero di registrazione:**

16194 del 9.12.14

**Composizione:**

28,73% (276,5 g/l)

Sale sodico di Alchiletere Solfato

**Formulazione:**

Liquido Solubile

ETRAVON PRO è un coadiuvante appositamente studiato per conferire una migliore bagnabilità alle poltiglie erbicide cui viene aggiunto. ETRAVON PRO può essere impiegato anche in aggiunta alle poltiglie anticrittogamiche e insetticide, assicurando una più elevata penetrazione ed efficacia ai prodotti utilizzati per combattere insetti il cui corpo è protetto da sostanze cerose e melate, e a quelli impiegati per controllare patogeni difficilmente raggiungibili nel caso di vegetali ricoperti da sostanze pruinose o cerose.

## DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

COLTURE	Dosi	INTERVALLO DI SICUREZZA
In aggiunta a erbicidi	1 - 2 l/ha nelle applicazioni con erbicidi	—

ETRAVON PRO può essere utilizzato sulle colture indicate in miscela con i seguenti erbicidi:

**FRUMENTO (tenero e duro)**

- Sulfoniluree (in formulazione WG) in miscela con Triazolinoni in post-emergenza della coltura, dalla 3ª foglia alla fine dell'accestimento, alla dose di 1,0-2,0 l/ha.

**FRUMENTO (tenero e duro), ORZO, SEGALE, AVENA, TRITICALE**

- Sulfoniluree (in formulazione WG) da sole o in miscela tra loro in post-emergenza della coltura, dalla 3ª foglia al secondo nodo di levata alla dose di 1,0-2,0 l/ha.
- Triazolopirimidine da sole o in miscela con Sulfoniluree, in post emergenza della coltura, da inizio accestimento a inizio levata, alla dose di 1,0 l/ha.

**MAIS**

- Sulfoniluree (in formulazione WG) da sole o in miscela con derivati dell'acido benzoico in post-emergenza della coltura, dalla 2ª alla 6ª foglia, alla dose di 1,0 l/ha.

**SOIA**

- Sulfoniluree (in formulazione WG) in post-emergenza della coltura, da 2-4 foglie vere, alla dose di 1,0 l/ha.

**RISO**

- Sulfoniluree (in formulazione WG) e Triazolopirimidine in post-emergenza della coltura, dalla 2ª foglia al 4º livello di accestimento, alla dose di 1 l/ha.

Registrazione Cheminova Agro Italia srl

## Product CP: Tabs

### • **CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE**

#### Indicazioni di pericolo (CLP)

•  
**ATTENZIONE**



#### Avvertenze

••••  
Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.