

Italia

Published on *Syngenta Italia* (<https://www.syngenta.it>)

[Home](#) > RIDOMIL GOLD SL

---

## RIDOMIL GOLD SL

---



## RIDOMIL GOLD SL

Ultimo aggiornamento:

28.06.2019

### Fungicidi

#### Agrofarmaco

**Numero di registrazione:**

10105 del 27.7.99

**Composizione:**

43,88% (465 g/l)

Metalaxil-M

**Formulazione:**

Liquido Solubile

RIDOMIL GOLD SL è un fungicida sistemico in formulazione liquida a base di Metalaxil-M. È specifico per i trattamenti al terreno contro *Pythium* e *Phytophthora*, agenti di marciumi radicali e del colletto su diverse colture orticole, soia, tabacco, colture ornamentali e da fiore in pieno campo e in serra, fragola, fruttiferi, conifere, latifoglie e tappeti erbosi. La sostanza attiva, applicata al suolo, penetra nelle radici e si distribuisce con la linfa nelle diverse parti della pianta, garantendo una prolungata azione preventiva nei confronti di questi patogeni. La formulazione liquida è idonea anche per l'applicazione attraverso gli impianti di fertirrigazione.

### Product CP: Tabs

- [COLTURE, CAMPI, MODALITÀ D'IMPIEGO](#)
- [CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE](#)

Scegli la coltura

-Tutte- ▼

Apply

**1**

[Successive](#)

**Actinidia**

**Anguria**

**Arancio**

**Cavolfiore**

**Cavolo broccolo**

**Clementino**

**Floricole**

**Florovivaismo**

**Forestali**

**Fragola**

**1**

[Successive](#)

**Avvertenze**

---

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

**Accorgimenti per  
il corretto  
impiego**

---

- Su peperone, superata la crisi di post-trapianto (ca. 10 gg) si consiglia di eseguire un primo intervento distribuendo il prodotto in prossimità del colletto ed incorporandolo al terreno. Un altro trattamento seguirà dopo 30 gg, operando sempre con la stessa modalità e rispettando gli stessi dosaggi. Su fragola eseguire il trattamento in banda, incorporando il prodotto prima dell'operazione di trapianto su impianti preesistenti. Intervenire prima della ripresa vegetativa. Se necessario, ripetere il trattamento a distanza di 30 giorni circa.
-