

SWITCH



SWITCH

Ultimo aggiornamento:

24.01.2020

Fungicidi

Agrofarmaco

Numero di registrazione:

9578 del 2.4.98

Composizione:

37,5%

Cyprodinil

25%

Fludioxonil

Formulazione:

Granuli Idrodisperdibili (Wg)

SWITCH è un fungicida particolarmente efficace nei confronti della Muffa grigia e di altri marciumi di numerose colture. In viticoltura è registrato anche per il controllo dei marciumi secondari del grappolo (*Aspergillus* spp. e *Penicillium* spp.). Grazie all'associazione complementare e sinergica di Fludioxonil (fenilpirrolo) e Cyprodinil (anilinopirimidina), si distingue per livello di efficacia e durata della protezione, anche nei confronti di popolazioni di funghi resistenti o solo parzialmente sensibili ad altri fungicidi in commercio. SWITCH è selettivo nei confronti dei più comuni ed importanti insetti ed acari utili. SWITCH non influenza la maturazione delle uve, i processi di fermentazione e di vinificazione e le qualità organolettiche dei vini.

Video of Come proteggere la vite da botrite in epoca pre-chiusura grappolo

Product CP: Tabs

- [COLTURE, CAMPI, MODALITÀ D'IMPIEGO](#)

- **CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE**

COLTURE, CAMPI, MODALITÀ D'IMPIEGO

SWITCH Aglio

Aglio

Muffa grigia

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

80 - 100 g/hl; 1 kg/ha 21

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni.

SWITCH Albicocco

Albicocco

Monilia

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

30-60 g/hl ; 0,3-1 kg/ha 7

Epoche d'impiego : Effettuare 1 trattamento ad inizio fioritura ed 1 trattamento a caduta petali. 1-2 trattamenti in pre-raccolta

SWITCH Basilico

Basilico

Marciume del colletto

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50 - 70 g/hl; 0,6 kg/ha 7

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni.

Muffa grigia

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50 - 70 g/hl; 0,6 kg/ha 7

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni.

SWITCH Cetriolo

Cetriolo

Muffa grigia e marciume fogliare**Dosi d'impiego** **Intervallo di sicurezza (giorni)**

60-80 ml/hl ; 0,6-0,8 kg/ha 3

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti

SWITCH Cicoria

Cicoria

Marciume del colletto (Sclerotinia major)**Dosi d'impiego** **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-70 g/hl ; 0,5-0,7 kg/ha 14

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

Muffa grigia e marciume fogliare**Dosi d'impiego** **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-70 g/hl ; 0,5-0,7 kg/ha 14

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

SWITCH Ciliegio

Ciliegio

Monilia

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

30-60 g/hl ; 0,3-1 kg/ha 7

Epoche d'impiego : Effettuare 1 trattamento ad inizio fioritura ed 1 trattamento a caduta petali. 1-2 trattamenti in pre-raccolta

SWITCH Cipolla

Cipolla

Botrite della Cipolla

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

80-100 g/hl ; 0,8-1 kg/ha 7

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

Muffa grigia e marciume fogliare

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

80-100 g/hl ; 0,8-1 kg/ha 7

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

SWITCH Crescione

Crescione

Marciume del colletto (Sclerotinia major)

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-70 g/hl ; 0,5-0,7 kg/ha 14

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

Muffa grigia e marciume fogliare

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-70 g/hl ; 0,5-0,7 kg/ha 14

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

SWITCH Dolcetta o valerianella

Dolcetta o valerianella

Marciume del colletto (Sclerotinia major)

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha 7

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

Muffa grigia e marciume fogliare

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha 7

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

SWITCH Endivia

Endivia

Marciume del colletto (Sclerotinia major)

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha 7

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

Muffa grigia e marciume fogliare

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha 7

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

SWITCH Erbe fresche

Erbe fresche

Marciume del colletto (Sclerotinia major)

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha 7

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni**Muffa grigia e marciume fogliare****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha 7

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

SWITCH Fagiolino

Fagiolino

Antracnosi**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1 kg/ha 14

Epoche d'impiego : Effettuare un massimo di 2 trattamenti per stagione a cadenza di 10-14 giorni.**Muffa grigia****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1 kg/ha 14

Epoche d'impiego : Effettuare un massimo di 2 trattamenti per stagione a cadenza di 10-14 giorni.**Sclerotinia****Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

1 kg/ha 14

Epoche d'impiego : Effettuare un massimo di 2 trattamenti per stagione a cadenza di 10-14 giorni.

SWITCH Fagiolo

Fagiolo

Antracnosi

Dosi d'impiego	Intervallo di sicurezza (giorni)
-----------------------	---

1 kg/ha	14
---------	----

Epoche d'impiego : Effettuare un massimo di 2 trattamenti per stagione a cadenza di 10-14 giorni.

Muffa grigia

Dosi d'impiego	Intervallo di sicurezza (giorni)
-----------------------	---

1 kg/ha	14
---------	----

Epoche d'impiego : Effettuare un massimo di 2 trattamenti per stagione a cadenza di 10-14 giorni.

Sclerotinia

Dosi d'impiego	Intervallo di sicurezza (giorni)
-----------------------	---

1 kg/ha	14
---------	----

Epoche d'impiego : Effettuare un massimo di 2 trattamenti per stagione a cadenza di 10-14 giorni.

SWITCH Finocchio

Finocchio

Marciumi da Sclerotinia

Dosi d'impiego	Intervallo di sicurezza (giorni)
-----------------------	---

60-80 g/hl ; 0,6-0,8 kg/ha	7
----------------------------	---

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti la malattia. Effettuare un massimo di 2 trattamenti per stagione a cadenza di 10-14 giorni.

Muffa grigia e marciume fogliare

Dosi d'impiego	Intervallo di sicurezza (giorni)
-----------------------	---

60-80 g/hl ; 0,6-0,8 kg/ha	7
----------------------------	---

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti alla comparsa delle condizioni predisponenti la

malattia. Effettuare un massimo di 2 trattamenti per stagione a cadenza di 10-14 giorni

SWITCH Floricole

Floricole

Marciumi da Botrytis

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

80 g/hl ; 0,8-1 kg/ha -

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 interventi

SWITCH Florovivaismo

Florovivaismo

Marciumi da Botrytis

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

80 g/hl ; 0,8-1 kg/ha -

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 interventi

SWITCH Fragola

Fragola

Muffa grigia e marciume fogliare

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

80 g/hl ; 0,8 kg/ha 2 (campo), 1 (serra)

Epoche d'impiego : Effettuare 2-3 trattamenti nelle fasi: inizio fioritura, fine fioritura ed ingrossamento dei primi frutti

SWITCH Lattuga

Lattuga

Marciume del colletto (*Sclerotinia major*)

Dosi d'impiego	Intervallo di sicurezza (giorni)
----------------	----------------------------------

50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha 7

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

Muffa grigia e marciume fogliare

Dosi d'impiego	Intervallo di sicurezza (giorni)
----------------	----------------------------------

50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha 7

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

SWITCH Melanzana

Melanzana

Muffa grigia e marciume fogliare

Dosi d'impiego	Intervallo di sicurezza (giorni)
----------------	----------------------------------

60-80 ml/hl ; 0,6-0,8 kg/ha 3

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti

SWITCH Ornamentali

Ornamentali

Marciumi da *Botrytis*

Dosi d'impiego	Intervallo di sicurezza (giorni)
----------------	----------------------------------

80 g/hl ; 0,8-1 kg/ha -

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 interventi

SWITCH Peperone

Peperone

Muffa grigia e marciume fogliare

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

60-80 ml/hl ; 0,6-0,8 kg/ha 3

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti

SWITCH Pero

Pero

Maculatura bruna o Alternariosi

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

60-80 g/hl ; 0,8-1 kg/ha 3

Epoche d'impiego : Da allegagione ad intervalli di 8-10 giorni e in pre-raccolta contro il marciume dei frutti. Effettuare al massimo 3 trattamenti per stagione

SWITCH Pesco

Pesco

Monilia

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

30-60 g/hl ; 0,3-1 kg/ha 7

Epoche d'impiego : Effettuare 1 trattamento ad inizio fioritura ed 1 trattamento a caduta petali. 1-2 trattamenti in pre-raccolta

SWITCH Pomodoro da industria

Pomodoro da industria

Muffa grigia e marciume fogliare

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

60-80 ml/hl ; 0,6-0,8 kg/ha 3

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti

SWITCH Pomodoro da mercato fresco

Pomodoro da mercato fresco

Muffa grigia e marciume fogliare

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

60-80 ml/hl ; 0,6-0,8 kg/ha 3

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti

SWITCH Radicchio

Radicchio

Marciume del colletto (Sclerotinia major)

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha 7

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

Muffa grigia e marciume fogliare

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha 7

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

SWITCH Rucola

Rucola

Marciume del colletto (Sclerotinia major)

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha 7

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

Muffa grigia e marciume fogliare

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha 7

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

SWITCH Scarola

Scarola

Marciume del colletto (Sclerotinia major)

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha 7

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

Muffa grigia e marciume fogliare

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

50-60 g/hl ; 0,6 kg/ha 7

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti con condizioni predisponenti le malattie. Effettuare un massimo di 3 trattamenti per stagione a cadenza di 10-12 giorni

SWITCH Susino

Susino

Monilia

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

30-60 g/hl ; 0,3-1 kg/ha 7

Epoche d'impiego : Effettuare 1 trattamento ad inizio fioritura ed 1 trattamento a caduta petali. 1-2 trattamenti in pre-raccolta

SWITCH Tabacco

Tabacco

Alternaria

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

80 g/hl ; 0,8-1 kg/ha -

Epoche d'impiego : -

SWITCH Vite da vino

Vite da vino

Marciumi secondari della Vite

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

80 g/hl ; 0,8 kg/ha 21

Epoche d'impiego : 1 trattamento entro pre-chiusura grappolo e 1 trattamento all'invasatura o in pre-raccolta. Effettuare un massimo di 2 interventi

Muffa grigia e marciume fogliare

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

80 g/hl ; 0,8 kg/ha 21

Epoche d'impiego : 1 trattamento entro pre-chiusura grappolo e 1 trattamento all'invasatura o in pre-raccolta. Effettuare un massimo di 2 interventi

SWITCH Vite per uva da tavola

Vite per uva da tavola

Marciumi secondari della Vite

Dosi d'impiego **Intervallo di sicurezza (giorni)**

80 g/hl ; 0,8 kg/ha 7

Epoche d'impiego : 1 trattamento entro pre-chiusura grappolo e 1 trattamento all'invasatura o in pre-raccolta. Effettuare un massimo di 2 interventi

Muffa grigia e marciume fogliare

Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

80 g/hl ; 0,8 kg/ha 7

Epoche d'impiego : 1 trattamento entro pre-chiusura grappolo e 1 trattamento all'invasatura o in pre-raccolta. Effettuare un massimo di 2 interventi

SWITCH Zucchini

Zucchini

Muffa grigia e marciume fogliare**Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)**

60-80 ml/hl ; 0,6-0,8 kg/ha 3

Epoche d'impiego : Iniziare i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia, intervenendo ad intervalli di 10-14 giorni. Effettuare un massimo di 3 trattamenti

CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE

Indicazioni di pericolo (CLP)•
ATTENZIONE**Avvertenze**

.....

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

Accorgimenti per il corretto impiego

- Bagnare accuratamente la vegetazione e i frutti. Con attrezzature a basso ed ultra basso volume rispettare la dose consigliata per ettaro. Il prodotto è miscibile con i fungicidi e gli insetticidi di più comune impiego. Utilizzare SWITCH ad almeno 20 metri da corpi idrici.