

Italia

Published on *Syngenta Italia* (<https://www.syngenta.it>)

[Home](#) > KENDO BI-ACTIVE

---

## KENDO BI-ACTIVE

---



## KENDO BI-ACTIVE

Ultimo aggiornamento:

28.06.2019

### Insetticidi

#### Agrofarmaco

**Numero di registrazione:**

15294 del 17.1.12

**Composizione:**

9,26% (100 g/l)

Chlorantraniliprole

4,63% (50 g/l)

Lambda-cialotrina

**Formulazione:**

Miscela Di Sospensione Di Capsule E Sospensione Concentrata

KENDO BI-ACTIVE è un nuovo insetticida ad ampio spettro di azione, dotato di rapido potere abbattente e lunga durata di azione sui parassiti. KENDO BI-ACTIVE è la soluzione completa e flessibile per il controllo di lepidotteri.

Agrofarmaco disponibile presso le Agenzie dei Consorzi Agrari

### Product CP: Tabs

- [COLTURE, CAMPI, MODALITÀ D'IMPIEGO](#)
- [CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE](#)

# COLTURE, CAMPI, MODALITÀ D'IMPIEGO

## KENDO BI-ACTIVE Carciofo

Carciofo

### **Afidi**

**Dosi d'impiego**    **Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,3 l/ha                    3

---

### **Chrysodeixis chalcites**

**Dosi d'impiego**    **Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,3 l/Ha                    3

---

### **Spodoptera exigua**

**Dosi d'impiego**    **Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,3 l/ha                    3

---

### **Spodoptera littoralis**

**Dosi d'impiego**    **Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,3 l/Ha                    3

---

## KENDO BI-ACTIVE Cavolo broccolo

Cavolo broccolo

### **Afidi**

**Dosi d'impiego**    **Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,4 l/Ha                    3

### **Cavolaia**

**Dosi d'impiego**    **Intervallo di sicurezza (giorni)**

0,4 l/Ha                    3

**Epoche d'impiego :** Lepidotteri: applicare KENDO BI-ACTIVE durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari. Tuta assoluta e cavoli: aggiungere 0,2-0,3 l/ha di BREAK-THRU S 240 e assicurare la completa bagnatura delle vegetazione

---

## Spodoptera

### Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4 l/Ha	3
----------	---

**Epoche d'impiego :** Lepidotteri: applicare KENDO BI-ACTIVE durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari. Tuta assoluta e cavoli: aggiungere 0,2-0,3 l/ha di BREAK-THRU S 240 e assicurare la completa bagnatura delle vegetazione

---

## Tignola delle Crucifere

### Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4 l/Ha	3
----------	---

**Epoche d'impiego :** Lepidotteri: applicare KENDO BI-ACTIVE durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari. Tuta assoluta e cavoli: aggiungere 0,2-0,3 l/ha di BREAK-THRU S 240 e assicurare la completa bagnatura delle vegetazione

---

## KENDO BI-ACTIVE Lattuga

Lattuga

### Afidi

### Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,15 l/Ha	14
-----------	----

## KENDO BI-ACTIVE Mais

Mais

### Diabrotica

### Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,3 l/Ha	14
----------	----

**Epoche d'impiego :** Applicare durante la fase di ovideposizione. Se necessario ripetere il trattamento dopo 7 giorni.

---

## Nottue

### Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,3 l/Ha	14
----------	----

**Epoche d'impiego :** Lepidotteri: applicare KENDO BI-ACTIVE durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari. Se necessario ripetere il trattamento dopo 7 giorni.

## Piralide del Mais

### Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,3 l/Ha	14
----------	----

**Epoche d'impiego :** Lepidotteri: applicare KENDO BI-ACTIVE durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari. Se necessario ripetere il trattamento dopo 7 giorni.

---

## KENDO BI-ACTIVE Mais dolce

Mais dolce

## Diabrotica

### Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,3 l/Ha	14
----------	----

**Epoche d'impiego :** Applicare durante la fase di ovideposizione. Se necessario ripetere il trattamento dopo 7 giorni.

## Nottue

### Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,3 l/Ha	14
----------	----

**Epoche d'impiego :** Lepidotteri: applicare KENDO BI-ACTIVE durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari. Se necessario ripetere il trattamento dopo 7 giorni.

## Piralide del Mais

### Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,3 l/Ha	14
----------	----

**Epoche d'impiego :** Lepidotteri: applicare KENDO BI-ACTIVE durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari. Tuta assoluta e

cavoli: aggiungere 0,2-0,3 l/ha di BREAK-THRU S 240 e assicurare la completa bagnatura delle vegetazione

---

## **KENDO BI-ACTIVE Patata**

Patata

### **Leptinotarsa decemlineata**

<b>Dosi d'impiego</b>	<b>Intervallo di sicurezza (giorni)</b>
-----------------------	---

0,3 l/ha	14
----------	----

**Epoche d'impiego :** Applicare alla comparsa dei primi adulti o al raggiungimento della soglia di intervento. Se necessario, ripetere il trattamento dopo 8-10 giorni

---

### **Phthorimae operculella**

<b>Dosi d'impiego</b>	<b>Intervallo di sicurezza (giorni)</b>
-----------------------	---

0,3 l/ha	14
----------	----

## **KENDO BI-ACTIVE Pomodoro da industria**

Pomodoro da industria

### **Afidi**

<b>Dosi d'impiego</b>	<b>Intervallo di sicurezza (giorni)</b>
-----------------------	---

0,4 l/ha	3
----------	---

### **Nottue gialle**

<b>Dosi d'impiego</b>	<b>Intervallo di sicurezza (giorni)</b>
-----------------------	---

0,4 l/ha	3
----------	---

**Epoche d'impiego :** Lepidotteri: applicare KENDO BI-ACTIVE durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari. Tuta assoluta e cavoli: aggiungere 0,2-0,3 l/ha di BREAK-THRU S 240 e assicurare la completa bagnatura delle vegetazione

---

### **Spodoptera**

<b>Dosi d'impiego</b>	<b>Intervallo di sicurezza (giorni)</b>
-----------------------	---

0,4 l/ha	3
----------	---

**Epoche d'impiego :** Lepidotteri: applicare KENDO BI-ACTIVE durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari. Tuta assoluta e cavoli: aggiungere 0,2-0,3 l/ha di BREAK-THRU S 240 e assicurare la completa bagnatura delle vegetazione

---

## Tuta assoluta

### Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4 l/Ha	3
----------	---

**Epoche d'impiego :** Lepidotteri: applicare KENDO BI-ACTIVE durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari. Tuta assoluta e cavoli: aggiungere 0,2-0,3 l/ha di BREAK-THRU S 240 e assicurare la completa bagnatura delle vegetazione

---

## KENDO BI-ACTIVE Pomodoro da mercato fresco

Pomodoro da mercato fresco

## Afidi

### Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4 l/Ha	3
----------	---

## Nottue gialle

### Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4 l/Ha	3
----------	---

**Epoche d'impiego :** Lepidotteri: applicare KENDO BI-ACTIVE durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari. Tuta assoluta e cavoli: aggiungere 0,2-0,3 l/ha di BREAK-THRU S 240 e assicurare la completa bagnatura delle vegetazione

---

## Spodoptera

### Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4 l/Ha	3
----------	---

**Epoche d'impiego :** Lepidotteri: applicare KENDO BI-ACTIVE durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari. Tuta assoluta e cavoli: aggiungere 0,2-0,3 l/ha di BREAK-THRU S 240 e assicurare la completa bagnatura delle vegetazione

---

## Tuta assoluta

## Dosi d'impiego Intervallo di sicurezza (giorni)

0,4 l/ha

3

**Epoche d'impiego :** Lepidotteri: applicare KENDO BI-ACTIVE durante la fase di ovideposizione o alla comparsa delle prime larve o delle erosioni fogliari. Tuta assoluta e cavoli: aggiungere 0,2-0,3 l/ha di BREAK-THRU S 240 e assicurare la completa bagnatura delle vegetazione

---

## CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE

### Indicazioni di pericolo (CLP)

•  
**ATTENZIONE**



### Avvertenze

.....  
Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

### Accorgimenti per il corretto impiego

• Si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro di KENDO BI-ACTIVE indicate in tabella per ciascuna coltura, indipendentemente dai volumi di acqua impiegati per la distribuzione. Non impiegare in serra.

---