

DYNALI



DYNALI

Ultimo aggiornamento:

12.07.2019

Fungicidi

Agrofarmaco

Numero di registrazione:

15263 del 27.03.13

Composizione:

g 2,8 (30 g/l)

Cyflufenamid

g 5,6 (60 g/l)

Difenoconazolo

Formulazione:

Concentrato Disperdibile

DYNALI è un innovativo antioidico per vite in formulazione concentrato disperdibile, a base di due sostanze attive a diverso meccanismo di azione: l'innovativa Cyflufenamid, appartenente alla nuova famiglia delle amidossime, e il Difenoconazolo, appartenente alla famiglia dei triazoli. DYNALI è dotato di un meccanismo di azione diverso da quello di tutti gli altri antioidici presenti in commercio, con i quali non manifesta resistenza incrociata. DYNALI agisce inibendo lo sviluppo del micelio, la formazione degli austeri e la sporulazione dell'oidio, e manifesta inoltre un'elevata attività preventiva unita ad una buona curatività. DYNALI, una volta distribuito sulle piante, è rapidamente assorbito dalla vegetazione. Nelle foglie possiede un'eccellente attività citotropica-translaminare ed in parte viene traslocato ad altri organi vegetativi grazie alla sistemica della componente triazolica. DYNALI inoltre aderisce tenacemente alle cere degli organi vegetali, conferendo al prodotto un'elevata resistenza al dilavamento e una lunga persistenza di azione possiede inoltre una significativa attività anche in fase di vapore. DYNALI è caratterizzato da un'ottima selettività sugli artropodi utili e da un favorevole profilo tossicologico e ambientale.

Product CP: Tabs

- **COLTURE, CAMPI, MODALITÀ D'IMPIEGO**

- **CLASSIFICAZIONE E AVVERTENZE**

Scegli la coltura

-Tutte- ▼

Apply

Vite da vino

Vite per uva da tavola

Indicazioni di pericolo (CLP)

•
ATTENZIONE



Avvertenze

•••••

Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

Accorgimenti per il corretto impiego

- Assicurare una completa e omogenea bagnatura delle vegetazione, e in particolare dei grappoli. Effettuare al massimo due interventi l'anno, intervenendo prima della comparsa dei sintomi della malattia.
