

PAKOSSE™

Fungicida per il controllo della peronospora del pomodoro e della vite da vino e da tavola
SOSPENSIONE CONCENTRATA

Codice FRAC: 27

PAKOSSE - Registrazione Ministero della Salute n 16081 del 10/06/2020

Composizione:

- Cymoxanil puro g. 20,9 (=225 g/L)

- Coformulanti*: q.b. a g. 100

*Contiene 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one



Belchim Crop Protection NV/SA

Technologielaan 7
1840 Londerzeel – Belgio
Tel +32 (0)52 300906

Distribuito da:

Syngenta Italia S.p.A.

Viale Fulvio Testi, 280/6 - Milano-
Tel. 02 334441

Stabilimento di produzione:

Arysta LifeScience Production Sprl - Rue

de Rénoy 26/2

4102 Ougrée - Belgio

Stabilimento di confezionamento

ALTHALLER ITALIA S.r.l.

Strada Com.le per Campagna, 5-20078

San Colombano al Lambro MI

Partita n°..... Contenuto: 0,5-1-2-5-10 L

INDICAZIONI DI PERICOLO: H314 – Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H361fd – Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto. H373 – Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H411 – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P101 – In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. P202 - Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P260 - Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P264 - Lavare accuratamente le mani dopo l'uso P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P272 - Gli indumenti da lavoro contaminati non dovrebbero essere portati fuori dal luogo di lavoro. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi.

Proteggere gli occhi/il viso. P310 – Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P301+P330+P331 - IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. P 391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito. P405 – Conservare sotto chiave. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:

EUH 401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di 5m dalla superficie di corpi idrici.

Durante l'applicazione gli operatori devono indossare guanti e indumenti protettivi.



PERICOLO

I lavoratori devono indossare guanti protettivi durante la raccolta.

Prima di rientrare nelle aeree trattate attendere che il deposito sulla superficie delle foglie sia completamente asciutto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleli.

CARATTERISTICHE

PAKOSSE è un fungicida citotropico-tranlaminare per il controllo della peronospora del pomodoro e della vite da vino e da tavola con azione sia preventiva che curativa. La sostanza attiva cymoxanil penetra completamente nei tessuti vegetali entro 6 ore con azione citotropica tranlaminare. Agisce cioè sia per contatto come i tradizionali antiperonosporici sugli elementi di propagazione della peronospora, sia all'interno dei tessuti vegetali colpiti (azione endoterapica), inibendo lo sviluppo del micelio.

DOSI, EPOCHE E MODALITÀ DI IMPIEGO

Vite da tavola e da vino: contro peronospora (*Plasmopara viticola*) alla dose di 0,5 l/ha. Effettuare fino ad un max di 6 trattamenti l'anno ad intervalli di 7 giorni, intervenendo durante tutto il ciclo vegetativo quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Utilizzare volumi d'acqua di 150-1000 L/ha.

Pomodoro (in campo): contro peronospora (*Phytophthora infestans*) alla dose di 0,5 l/ha. Effettuare fino ad un max di 5 trattamenti l'anno ad intervalli di 5 giorni, intervenendo durante tutto il ciclo vegetativo quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Utilizzare volumi d'acqua di 150-600 L/ha.

Pomodoro (in serra): contro peronospora (*Phytophthora infestans*) alla dose di 0,5 l/ha. Effettuare fino ad un max di 5 trattamenti l'anno ad intervalli di 5 giorni, intervenendo durante tutto il ciclo vegetativo quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia. Utilizzare volumi d'acqua di 600-1500 L/ha.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Effettuare i trattamenti quando la vegetazione è asciutta.

Quando si impiegano altri fungicidi ad azione preventiva, il trattamento con PAKOSSE assicura anche un effetto curativo.

Il prodotto non è nocivo per le api, né costituisce un rischio inaccettabile per gli insetti utili.

GESTIONE DELLA RESISTENZA:

L'uso ripetuto per anni di fungicidi aventi lo stesso meccanismo d'azione può dar luogo a fenomeni di resistenza e i ceppi meno sensibili possono sopravvivere e diventare dominanti. Per ridurre il rischio di insorgenza di resistenze, si raccomanda di associare sempre l'uso del PAKOSSE con prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

COMPATIBILITÀ: non è compatibile con prodotti a reazione alcalina (Polisolfuri, Poltiglia bordolese) e gli oli minerali.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZA: conservare al riparo dell'umidità e a temperature comprese tra 0°C e 30°C

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima del raccolto per pomodoro, e 14 giorni per vite.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O
CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE
ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.**