

MONDAK® 480 S

Erbicida selettivo in soluzione acquosa per il controllo delle malerbe dicotiledoni e monocotiledoni nei cereali (mais, frumento, sorgo) e stoppie

Composizione

100 g di prodotto contengono:

Dicamba puro g 41,0 (= 480 g/l)
coformulanti q.b.a g 100



INDICAZIONI DI PERICOLO

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.



EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA

P264 Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

P273 Non disperdere nell'ambiente.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità della normativa vigente

Syngenta Italia S.p.A.

Viale Fulvio Testi 280/6 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Registrazione Ministero della Salute n. 13154 del 28.08.2006

Stabilimenti di produzione e confezionamento:

Syngenta Chemicals B.V. – Seneffe (Belgio)

Adama Manufacturing Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny (Polonia)

Chemark ZRT, 06/75 hrsz., H-8182 Berhida, Peremarton-Gyartelep

(Ungheria)

Phyteurop, Rue Pierre My, Z.I. de Grande Champagne, 49260 Montreuil-Bellay (Francia)

Stabilimento di confezionamento:

ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

Stabilimenti di rietchettatura:

ANRIV S.r.l. - Ferrara (FE) - Italia

Sinteco Logistics Sp.A. - S. Giuliano Milanese (MI) - Italia

Contenuto netto: ml 250-500; litri 1 - 5

Partita n. vedi corpo della confezione

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale da tutelare

NORME PRECAUZIONALI

Conservare questo prodotto chiuso sotto chiave, in luogo inaccessibile agli animali domestici.

Conservare la confezione ben chiusa.

Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: Irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia.

Terapia: Sintomatica. Consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE

MONDAK 480 S è un erbicida di post-emergenza, che viene assorbito per via fogliare e radicale e traslocato in tutta la pianta dalla circolazione linfatica e svolge la sua azione alterando il metabolismo enzimatico delle malerbe.

Infestanti sensibili.

Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Amaranti (*Amaranthus spp.*), Forbicina (*Bidens spp.*), Vilucchione (*Calystegia sepium*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Farinello (*Chenopodium album*), Stoppione (*Cirsium arvense*), Vilucchio (*Convolvulus arvensis*), Stramonio (*Datura stramonium*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Attaccamano (*Galium aparine*), Uva turca (*Phytolacca decandra*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Romice (*Rumex spp.*), Sicio (*Sicyos angulatus*), Senecione (*Senecio vulgaris*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Spergola (*Spergula arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*), Soffione (*Taraxacum officinalis*), Vecce (*Vicia spp.*), Nappola italiana (*Xanthium spp.*).

Infestanti mediamente sensibili:

Anagallide (*Anagallis arvensis*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Crisantemo selvatico (*Chrysanthemum segetum*), Cocomero asinino (*Ecballium elaterium*), Papaveri (*Papaver spp.*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Senape comune (*Sinapis arvensis*), Ortica (*Urtica urens*), Veronica (*Veronica spp.*).

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

. Mais

Epoca: applicare il prodotto in post-emergenza del mais dallo stadio da 2 fino a 8 foglie,

Dosi : 0,3-0,6 l/ha.

Non applicare il prodotto su colture di mais impiantate su terreni sabbiosi in quanto in questi terreni potrebbe essere fitotossico per la coltura.

Prima di applicare sulle linee pure di mais, da solo o in miscela con altri prodotti, eseguire prove di selettività su alcune piante prima di estendere l'applicazione sull'intero appezzamento. Non impiegare su linee pure utilizzate per la produzione di Mais dolce

. Sorgo da granella

Epoca: in post-emergenza prima che le piantine di sorgo abbiano superato la 5° foglia.

Dose: 0,35-0,44 l/ha.

In caso di impiego su nuove varietà controllare preventivamente la selettività.

. Frumento (incluso frumento duro)

Epoca: applicare il prodotto in post-emergenza della coltura dallo stadio di 4-5 foglie fino all'inizio della levata

Dose: 0,25 l/ha

Stoppie

Epoca: applicare il prodotto in post-emergenza delle infestanti dicotiledoni annuali e perennanti

Dose: 0,6 l/ha

Avvertenze agronomiche:

Impiegare MONDAK 480 S su infestanti nei primi stadi di sviluppo al fine di eliminare quanto più precocemente possibile la competizione delle malerbe.

Volume di irrorazione :

Diluire MONDAK 480 S in 200-500 litri di acqua per ettaro per il mais, 200-400 litri di acqua per ettaro per tutte le altre colture utilizzando ugelli a ventaglio.

Avvertenze

- Sciacquare bene la botte in caso di impiego successivo su colture non indicate in questa etichetta.

- Evitare che la nube irrorante giunga a contatto con colture vicine.

COMPATIBILITA'

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 16/06/2021 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 4.12.2021