

ENIFUL ^{NOVITÀ}

L'insetticida specifico per il controllo delle cocciniglie

 **Eniful**[®]

syngenta[®]



ENIFUL è l'insetticida a base del principio attivo pyriproxyfen, un potente regolatore di crescita (IGR) appartenente ai mimetici dell'ormone giovanile degli insetti.

Grazie alle caratteristiche del suo principio attivo e alla sua modalità di azione, **ENIFUL è efficace nei confronti di numerose cocciniglie su pomacee, drupacee, agrumi, olivo e ornamentali.** Inoltre è efficace anche contro la mosca bianca di **solanacee e cucurbitacee.**

VANTAGGI

- Il principio attivo, pyriproxyfen, è l'unico rappresentante del gruppo dei mimetici dell'ormone giovanile (gruppo IRAC 7C).
- Perfetta selettività sulle colture e sugli insetti utili.
- Un solo principio attivo dall'efficacia duratura.
- Nessuna resistenza incrociata.




POSIZIONAMENTO TECNICO (es. pomacee)



 **Eniful**[®]



Rigonfiamento gemme



Apertura gemme (punte verdi)




Orecchiette di topo

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

COLTURE	PARASSITI	Dosi (ml/ha)	Dosi (ml/ha)	EPOCHE D'IMPIEGO	N° MASSIMO TRATTAMENTI PER ANNO	INTERVALLO DI SICUREZZA
Olivo	Cocciniglie (<i>Saissetia oleae</i>)	25 - 30	200 - 450	Effettuare 1 applicazione in prefioritura contro le forme larvali che hanno superato il periodo invernale.	1	—
Agrumi	Cocciniglia a virgola (<i>Lepidosaphes sp.</i>) Cocciniglia mezzo grano di pepe (<i>Saissetia oleae</i>)	40 - 50	800 - 1500	Contro le cocciniglie effettuare 1 applicazione per stagione intervenendo alla presenza delle prime forme larvali preferibilmente della prima generazione. In presenza di <i>Parlatoria sp.</i> trattare quando le prime larve sono visibili.	1	28 gg
	Cocciniglia bianca/rossa forte degli agrumi (<i>Aonidiella aurantii</i>) Parlatoria (<i>Parlatoria sp.</i>) Cocciniglia bianca degli agrumi (<i>Aspidiotus neri</i>)	50 - 75	1000 - 2250			
	Cocciniglia di San Josè (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	40 - 50	800 - 1500			
Peperone Cetriolo Cetriolino Zucchini (in serra) Pomodoro Melanzana (in pieno campo e serra)	Mosche bianche (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	50 - 75	500 - 1125	Applicare il prodotto 1 o 2 volte per stagione. La prima applicazione deve essere effettuata alla comparsa dei primi adulti, la seconda circa 2 settimane più tardi.	1 - 2	3 gg
Pomacee Drupacee (pesco, nettarina, albicocco, susino, ciliegio)	Cocciniglia di San Josè (<i>Comstockaspis perniciosa</i> = <i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) Cocciniglia bianca del pesco (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	35 - 40	210 - 600	Su pomacee, albicocco e ciliegio trattare prima della fioritura. Trattare una sola volta prima della fioritura per il controllo delle forme giovanili (neanidi) di Cocciniglia di San Josè e per il controllo della Cocciniglia bianca del pesco allo stadio di femmina fecondata. Su pesco, nettarina e susino è possibile intervenire anche in post-fioritura, nella fase di accrescimento dei frutti.	1 pomacee, albicocco, ciliegio 1 - 2 pesco, nettarina, susino	14 gg pesco, nettarina, susino
Floreali Ornamentali	Cocciniglie	25 - 75	200 - 900	Contro le cocciniglie effettuare 1 applicazione per stagione intervenendo alla presenza delle prime forme larvali preferibilmente della prima generazione	1	—
	Mosche bianche (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	50 - 75	500 - 1125	Applicare il prodotto 1 o 2 volte per stagione. La prima applicazione deve essere effettuata alla comparsa dei primi adulti, la seconda circa 2 settimane più tardi.	1 - 2	

CARATTERISTICHE

Composizione	Pyriproxyfen 10,9% (100 g/l)
Formulazione	Concentrato emulsionabile
Indicazioni di pericolo	PERICOLO 
Confezioni	Flaconi da 1 l in cartoni da 12 pezzi
Registrazione Ministero della Salute	N.12117 del 1.3.2004

Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute, a base di Pyriproxyfen g 10,9 (100 g/l), n. di registrazione 12117. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio dei preparati. © e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta. ENIFUL®: registrazione Sumitomo Chemical Agro Europe s.a.s.



 **Eniful®**

syngenta.

Syngenta Italia S.p.A.

Viale Fulvio Testi, 280/6 - 20126 Milano - Tel. 02.33444.1 - www.syngenta.it