VITE, FRUTTA E COLTURE ORTICOLE BIOLOGICAMENTE PROTETTI

CONSENTITO IN Agricoltura Biologica

syngenta Biologicals

Arbiogy®

NOVITÀ

Insetticida e acaricida biologico registrato per vite, drupacee, floreali e ornamentali

COMPOSIZIONE
Beauveria bassiana (ceppo ATCC 74040)
g 0,0185*
**contiene non meno di 2,3 x 10^7 spore vitali/ml*

FORMULAZIONE
olio dispersibile

NUMERO DI REGISTRAZIONE
12669 del 7.8.06

INDICAZIONI DI PERICOLO
—

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Colture	Parassiti	Dosi (l/ha)
Vite da vino Uva da tavola	Acari tetranichidi *(Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini)* Tripidi *(Frankliniella occidentalis, Thrips* spp.*)* Cicalina della flavescenza dorata *(Scaphoideus titanus)*	1-1,5
Pesco Nettarine Albicocco Susino	Tripidi *(Frankliniella occidentalis, Thrips major, Taeniothrips meridionalis)*	1-1,5
	Mosca della frutta *(Ceratitis capitata)*	1-2
Ciliegio	Mosca delle ciliegie *(Rhagoletis cerasi)*	1-2
Floreali e ornamentali *(in pieno campo e serra)*	Aleurodidi *(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci, Aleyrodes proletella)*	0,75-1

Bemotius®

NOVITÀ

Insetticida naturale a base di azadirachtin a per la protezione di agrumi, melo, vite, fragola, floreali e ornamentali e numerose orticole in campo e serra

COMPOSIZIONE
Azadirachtin A 2,75%
(26 g/l)

FORMULAZIONE
concentrato emulsionabile

NUMERO DI REGISTRAZIONE
18288 del 20/01/2023

INDICAZIONI DI PERICOLO
ATTENZIONE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Colture	Parassiti	Trattamento e Dosi (l/ha)
Agrumi (arancia, limone, pompelmo, mandarino)	Afidi, Cocciniglie, Aleurodidi, Minatori fogliari (lepidotteri), Cicaline, Tripidi, *Ceratitis* sp.	Fogliare 0,75-1,5
Melo	Afidi, Minatori fogliari (lepidotteri), Cicaline, Larve di lepidotteri	Fogliare 1,0-1,5
Vite	Cicaline, *Scaphoideus titanus*, Tripidi, Piralide della vite *(Sparganothis pilleriana)*	Fogliare 1,0-1,5
Fragola *(in pieno campo e serra)*	Afidi, Aleurodidi, Nottuidi, Tripidi, Larve di Lepidotteri	Fogliare 1,0-1,5
Fragola *(in serra)*		Applicazione al suolo *(per irrigazione a goccia)** 1,5
Pomodoro, Melanzana, *(in pieno campo e serra)*	Afidi, Aleurodidi, Dorifora della patata, Minatori fogliari (Ditteri), Nottuidi, Tripidi, Tignola del pomodoro	Fogliare 1,0-1,5
Peperone *(in pieno campo)*		
Pomodoro, Melanzana, Peperone *(in serra)*		Applicazione al suolo *(per irrigazione a goccia)** 1,5
Cetriolo, Zucchino, Melone, Cocomero, Zucca *(in pieno campo e serra)*	Afidi, Aleurodidi, Dorifora della patata, Minatori fogliari (Ditteri), Nottuidi, Tripidi	Fogliare 1,0-1,5
Cetriolo, Zucchino, Melone, Cocomero, Zucca *(in serra)*		Applicazione al suolo *(per irrigazione a goccia)** 1,5
Lattughe e insalate Foglie di spinaci e simili Prodotti baby leaf Erbe fresche Fiori commestibili	Afidi, Aleurodidi, Minatori fogliari (Ditteri), Nottuidi	Fogliare 1,0-1,5 *(in pieno campo e serra)*
		Applicazione al suolo *(per irrigazione a goccia)** 1,5 *(in serra)*
Ortaggi a bulbo (cipolla, aglio)	Tripidi	Fogliare 1,0-1,5
Carota	Afidi, Ditteri e Larve di lepidotteri	
Cavolfiori Cavolo cappuccio Cavolo verza	Afidi, Nottuidi, Tignole	
Patata	Afidi, Dorifora della patata, Tignole	
Floreali e ornamentali *(in pieno campo e serra)*	Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Larve di lepidotteri, Minatori fogliari, Tripidi, Bombice dispari *(Lymantria dispar)*, Tortrice delle querce *(Tortrix viridana)*, Processionaria del pino *(Thaumetopoea pityocampa)*	Fogliare 1,0-1,5
Floreali e ornamentali *(in serra)*		Applicazione al suolo *(per irrigazione a goccia)** 1,5

*** Impieghi per irrigazione a goccia:** Intervenire dal post-trapianto delle colture subito dopo il superamento della crisi di trapianto, ripetendo i trattamenti ad intervalli di 10 giorni in funzione della pressione dei fitofagi o fitomizi target.

Clavitus® 13SL

NOVITÀ

Insetticida biologico a base di una tripla miscela costituita da: sali potassici degli acidi grassi, oli vegetali e oli essenziali che garantisce un'efficace protezione verso un'ampia gamma di insetti e acari dannosi per le colture orticole

COMPOSIZIONE
Sali potassici di acidi grassi (C14-C20)
g 14,02 (130,4 g/l)

FORMULAZIONE
concentrato solubile

NUMERO DI REGISTRAZIONE
17912 del 25.10.21

INDICAZIONI DI PERICOLO
ATTENZIONE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Colture	Parassiti	Dosi (l/hl) di acqua	Dosi (l/ha) per applicazione
Pomodoro Melanzana *(in serra)*	Mosche bianche *(Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci)* Minatrice fogliare del pomodoro *(Tuta absoluta)* Afidi *(Aphis gossipyii, Aphis fabae, Myzus persicae)* Cimici *(Palonema prasina, Aelia rostrata, Nezara viridula, Chlorochroa* spp.*)* Tripidi *(Frankliniella occidentalis)* Acari	1,5 - 1,9	15 - 19
Pomodoro *(in pieno campo)*			
Cetriolo Zucchino Melone Cocomero Zucca *(in serra)*			
Cavolo Cavolfiore *(in serra)*			
Fagioli Piselli *(in serra)*			



Romeo®

NOVITÀ

Disponibile anche presso i Consorzi Agrari con il marchio Actileaf®

Induttore di resistenza biologico attivo su diverse malattie fungine come peronospora, oidio e botrite della vite e numerose orticole

COMPOSIZIONE
Cerevisane 94,1%

FORMULAZIONE
polvere bagnabile

NUMERO DI REGISTRAZIONE
17058 del 16.4.18

INDICAZIONI DI PERICOLO
—

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Colture	Pieno campo / Serra	Patogeni	Dosi (kg/ha)
Cetriolo, zucchino, cetriolini e altre cucurbitacee con buccia commestibile	Serra	Oidio	0,5
Melone, anguria, zucca e altre cucurbitacee con buccia non commestibile	Pieno campo	Oidio	0,5
Lattuga e altri tipi di insalata	Serra	Peronospora	0,75
Fragola	Serra	Botrite	0,75
Pomodoro e melanzana	Serra	Botrite	0,5
Vite da vino e vite da tavola	Pieno campo	Oidio, Peronospora, Botrite	0,25

Taegro®

Fungicida biologico per il controllo di botrite e oidio su vite e colture orticole e frutticole

COMPOSIZIONE
Bacillus amyloliquefaciens (ceppo FZB24)
g 13
(UFC unità formanti colonie $1x10^{10}$ per grammo)

FORMULAZIONE
polvere bagnabile

NUMERO DI REGISTRAZIONE
17469 del 24.3.20

INDICAZIONI DI PERICOLO
–

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO per applicazioni in SERRA

Colture	Patogeni	Dosi (g/ha)
Cetriolo, Cetriolino Zucchino, Melone Cocomero	Oidio *(Podosphaera xanthii, Spaerotheca fuliginea)*	185 - 370
Lattughe e insalate	Bremia *(Bremia lactucae)*	
Pomodoro, Melanzana Peperone, Peperoncino	Oidio *(Oidium neolycopersici, Leveillula taurica)* Alternariosi *(Alternaria* sp., *Alternaria solani)*	
Fragola	Botrite *(Botrytis cinerea)*	
Piccoli frutti	Botrite *(Botrytis cinerea)* Oidio *(Sphaerotheca mors-uvae, Microsphaera grossulariae, Sphaerotheca macularis, Podosphaera aphanis, Sphaerotheca* spp.*)*	

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO per applicazioni in CAMPO

Colture	Patogeni	Dosi (g/ha)
Vite: uva da tavola e da vino	Botrite *(Botrytis cinerea)* Oidio *(Erysiphe necator)* Marciume acido *(Kloeckera apiculata, Saccharomicopsis vini, Candida* spp., *Acetobacter* spp., *Gluconobacter* spp.*)*	185 - 370
Lattughe e insalate	Bremia *(Bremia lactucae)* Sclerotinia *(Sclerotinia sclerotiorum)*	
Cetriolo, Cetriolino, Zucchino, Zucca, Melone, Cocomero	Oidio *(Podosphaera xanthii, Spaerotheca fuliginea)*	
Pomodoro, Melanzana, Peperone, Peperoncino	Oidio *(Oidium neolycopersici, Leveillula taurica)* Alternariosi *(Alternaria* sp., *Alternaria solani)*	
Fragola e piccoli frutti	Botrite *(Botrytis cinerea)*	
Carciofo	Oidio *(Leveillula taurica)*	
Asparago	Botrite *(Botrytis cinerea)* Stemfiliosi *(Stemphylium vesicarium)*	
Erbe fresche	Sclerotinia *(Sclerotinia* sp.*)* Botrite *(Botrytis squamosa, Botrytis allii)* Oidio *(Erysiphe sp.)*	
Ravanello	Sclerotinia *(Sclerotinia sclerotiorum)* Oidio *(Erysiphe crusiferarum)*	
Sedano, Finocchio	Botrite *(Botrytis cinerea)* Sclerotinia *(Sclerotinia sclerotiorum)* Alternariosi *(Alternaria* sp.*)*	
Insalate *(scarola, indivia, cicoria, radicchio, valerianella, rucola, senape juncea, crescione, barbarea e prodotti baby leaf)*, escluse le lattughe	Botrite *(Botrytis cinerea)*	
Cece, Lenticchia	Botrite *(Botrytis cinerea)* Sclerotinia *(Sclerotinia sclerotiorum)*	
Cavoli *(cavoli a foglia, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli rapa)*	Botrite *(Botrytis cinerea)*	
Aglio	Botrite *(Botrytis allii)*	
Spinacio	Botrite *(Botrytis cinerea)*	
Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio	Botrite *(Botrytis cinerea)*	
Castagno	Mal dell'inchiostro *(Phytophthora cambivora, Phytophthora cinnamomi, Cryphonectria parasitica)*	
Mandorlo, Noce, Nocciolo	Monilia *(Monilia* spp.*)*	
Melograno	Botrite *(Botrytis cinerea)*	
Kiwi [1]	Botrite *(Botrytis cinerea)*	370

[1] su kiwi impiegare nello stadio vegetativo compreso fra l'inizio e la fine della fioritura (BBCH 60-69).

Tellus® WP

Fungicida biologico per la prevenzione dalle malattie fungine del terreno e mal dell'esca della vite

COMPOSIZIONE
T. asperellum (ceppo ICC 012) g 2
T. gamsii (ceppo ICC 080) g 2
(UFC unità formanti colonie $3x10^7$ per grammo)

FORMULAZIONE
polvere bagnabile

NUMERO DI REGISTRAZIONE
16527 del 26.11.15

INDICAZIONI DI PERICOLO
—

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Colture	Patogeni	Dosi
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Carota, Ravanello	Particolarmente indicato nella prevenzione degli attacchi di funghi parassiti dell'apparato radicale e del colletto quali: *Armillaria mellea* *Phytophthora* spp. *Pythium* spp. *Rhizoctonia solani* *Sclerotinia sclerotiorum* *Sclerotium rolfsii* *Thielaviopsis basicola* *Verticillium dahliae*	**Orticole** In vivaio: Applicazione substrato: 0,25 kg/m^3 Immersione vassoi: 10 g/litro In serra o pieno campo: 2,5 kg/ha **Floricole ed ornamentali** In vivaio: Applicazione substrato: 0,25 kg/m^3 Immersione vassoi: 10 g/litro In serra o pieno campo: 2,5 kg/ha
Zucchino, Melone, Cetriolo		
Lattughe ed altre insalate comprese le brassicacee		
Finocchio, Sedano, Basilico, Erbe aromatiche		
Fragola		
Carciofo, Spinacio		
Fagiolo, Fagiolino		
Floricole ed ornamentali		
Vite	Mal d'esca	250 g/hl
Pero	Maculatura bruna	2,5 kg/ha
Drupacee	Cancri rameali, Deperimento delle drupacee	1 kg/ha
Colture arboree da frutto, Piante ornamentali e forestali	Armillaria	2,5 kg/ha

Per colture floricole, ornamentali e orticole: trattare le piantine provenienti da semenzaio, prima della messa a dimora definitiva immergendo i pani di terra o i contenitori alveolari per alcuni minuti in una sospensione ottenuta con 10 grammi di TELLUS WP ogni litro di acqua.
Trapiantare poi in terreno precedentemente trattato con TELLUS WP con 250 gr di TELLUS WP ogni 1000 m^2 di superficie.

Primial®

Insetticida biologico per il controllo delle larve dei lepidotteri

COMPOSIZIONE
Bacillus thuringiensis Berliner var. *Kurstaki*
(sierotipo 3a, 3b – ceppo SA 11)
g 6,4 con un'attività insetticida pari a
53.000 US*/mg di prodotto
(*US - Unità Spodoptera basate su prove biologiche con *Spodoptera exigua*)

FORMULAZIONE
granuli idrodispersibili

NUMERO DI REGISTRAZIONE
13159 del 7.6.06

INDICAZIONI DI PERICOLO
ATTENZIONE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Colture	Parassiti MAX N. TRATTAMENTI/ANNO: 6 - INTERVALLO TRA LE APPLICAZIONI: 7 GIORNI	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)
Agrumi	Tignola *(Prays citri)*, Tortricide *(Cacoecia)*	75	1 - 2,25
Vite	Tignole *(Eupoecilia ambiguella, Lobesia botrana)*	75	0,5 - 0,75
Albicocco	Tortricidae *(Spilonota ocellana, Hedya nubiferana)* Falena *(Operophtera brumata)*, Limantridi *(Lymantria dispar, Orgya* spp.*, Euproctis chrysorrhoea)*, Nottue *(Orthosia* spp.*)*, Bombice gallonata *(Malacosoma neustria)*	75	0,75
	Tignola orientale *(Cydia molesta)*, Tignola *(Anarsia lineatella)*	100	1
Pesco	Tignole *(Adoxophyes orana Pandemis heparana, Cacoecia, Archips podana)*	100	1
Susino	Falene *(Operophtera brumata (L.))*, Tignola *(Adoxophyes orana)*	75	0,75
	Tignola orientale *(Cydia molesta)*, Tarlo *(Zeuzera pyrina (L.))*	100	1
Ciliegio	Falene *(Operophtera brumata (L.), Hibernia defoliaria)*	75	0,75
Melo Pero	Carpocapsa *(Cydia pomonella)*, Tarlo *(Zeuzera pyrina (L.))*, Tignola orientale *(Cydia molesta)*	100	1
	Falena *(Operophtera brumata (L.))* Tignole *(Archips podana Adoxophyes orana e/o Pandemis heparana, Spilonota ocellana, Hedya nubiferana)*	75	0,75
Ribes	Falene *(Incurvaria capitella)*, Piralide *(Zophodia grossulariella)*, Geometra del ribes *(Abraxas grossulariata)*	75	0,75
Lampone	Tignole (*Cnephasia* spp.*, Olethreutes lucunana)*	75	0,75
Mandorlo	Tignola orientale *(Cydia molesta)*	100	1
	Falene *(Operophtera brumata (L.))*	75	0,75
Nocciolo	Tentredine *(Croesus septentrionalis)*	75	0,75
	Tarlo *(Zeuzera pyrina (L.))*	100	1
Noce	Tignola *(Gracillaria roscipennella (=Caloptilia))*	75	0,75
	Tarlo *(Zeuzera pyrina (L.))*	100	1
Castagno	Tarlo *(Zeuzera pyrina (L.))*	100	1
Olivo	Tignola *(Prays oleae)*	75	0,5 - 0,9
Carciofo Sedano	Nottue *(Gortyna xanthenes, Autographa gamma, Spodoptera* spp.*)*, Bella dama *(Cynthia cardui)*	150	0,5 - 1,5
Aglio, Cipolla, Scalogno, Porro	Tignola della cipolla *(Acrolepiopsis assectella)*	200	1 - 1,5
Pomodoro	Nottue *(Helicoverpa armigera, Mamestra* spp.*, Autographa gamma)*, Tignola del pomodoro *(Tuta absoluta)*	150	0,5 - 1,5
Peperone Melanzana	Nottue *(Helicoverpa armigera, Mamestra* spp.*, Autographa gamma, Spodoptera* spp.*)*, Piralide *(Ostrinia* spp.*)*, Tignola *(Tuta absoluta)*	150	0,5 - 1,5
Patata	Tignola *(Phthorimaea operculella)*	200	1 - 1,5

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Colture	Parassiti MAX N. TRATTAMENTI/ANNO: 6 - INTERVALLO TRA LE APPLICAZIONI: 7 GIORNI	Dosi (g/hl)	Dosi (kg/ha)
Fagiolino	Piralide *(Ostrinia* spp.*)* Nottue *(Spodoptera* spp.*, Plusia* spp.*)*	150	0,5 - 1,5
Fagiolo	Piralide *(Ostrinia* spp.*)* Nottue *(Spodoptera* spp.*, Plusia* spp.*)*	150	0,5 - 1,5
	Nottue *(Gortyna* spp.*, Mamestra brassicae, Autographa gamma, Spodopetera littoralis, Helicoverpa armigera)*, Pieridae *(Pieris* spp.*)*, Depressaria delle ombrellifere *(Depressaria* spp.*)*, Piralide *(Ostrinia* spp.*)*	200	1 - 1,5
Ortaggi a foglia (Lattughe e insalate, scarola dente di leone, bietola rossa, indivia, spinacio, songino, finocchio)	Nottue *(Mamestra brassicae, Autographa gamma, Spodoptera littoralis, Helicoverpa armigera)*	150	0,5 - 1,5
Cavoli (cavolfiore, broccoli, cavolo cappuccio, etc)	Nottue *(Mamestra brassicae, Lacanobia oleracea, Autographa gamma, Helicoverpa armigera, Plutella* spp.*)*, Piralide *(Ostrinia* spp.*)*	150	0,5 - 1,5
Zucchino, Cetriolo, Cetriolino	Nottue *(Helicoverpa armigera, Spodoptera* spp.*, Plusia* spp.*)*	150	0,5 - 1,5
Melone, Anguria	Nottue *(Mamestra* spp.*, Autographa gamma, Helicoverpa armigera, Spodoptera* spp.*)*	150	0,5 - 1,5
Fragola	Piralide *(Duponchelia fovealis)*, Nottue *(Spodoptera* spp.*, Helicoverpa armigera)*	150	0,5 - 1,5
Tabacco	Nottue *(Autographa gamma)*	200	1 - 1,5
Mais Mais dolce	Nottue *(Gortyna* spp.*, Mamestra brassicae, Autographa gamma, Spodopetera littoralis, Helicoverpa armigera)*, Pieridae *(Pieris* spp.*)*, Depressaria delle ombrellifere *(Depressaria* spp.*)*, Piralide *(Ostrinia* spp.*)*	200	1 - 1,5
Piante aromatiche	Nottue *(Mamestra brassicae, Autographa gamma, Spodoptera* spp.*, Helicoverpa armigera)*, Pieride *(Pieris* spp.*)*, Depressaria delle ombrellifere *(Depressaria* spp.*)*	200	1
Ornamentali	Nottue *(Mamestra brassicae, Autographa gamma, Spodoptera* spp.*, Helicoverpa armigera)*, Pieride *(Pieris* spp.*)*, Depressaria delle ombrellifere *(Depressaria* spp.*)*	75	0,5 - 0,9
Arbusti ornamentali	Processianaria *(Thaumetopoea pityocampa)*, Nottue *(Mamestra brassicae, Autographa gamma, Spodoptera* spp.*, Helicoverpa armigera)*, Tignola *(Cydia pomonella)*, Limantria *(Lymantria dispar)*, Pidocchio nero dell'olivo *(Liothrips oleae)*, Pieridi *(Pieris* spp.*)*, Depressaria delle ombrellifere *(Depressaria* spp.*)*	75	0,5 - 0,9
Colture da seme	Noctuidae *(Mamestra brassicae, Autographa gamma, Spodoptera* spp. *Helicoverpa armigera)*, Pieridae *(Pieris* spp.*)*, Oecophoridae *(Depressaria* spp.*)*	100	1
Banana	Nottue *(Chrysodeixis chalcites, Spodoptera litoralis)*	100	0,8 - 1,5
Cotone	Nottue *(Helicoverpa* spp.*, Spodoptera* spp.*, Plusia* spp.*)*	75	0,5 - 0,75
Tappeti erbosi di giardini pubblici o privati, campi sportivi	Nottue *(Spodoptera spp.)*	200	1 - 2
Verde urbano	Ifantria *(Hyphantria cunea)*, Limantria *(Lymantria dispar)*	200	1 - 2

Karate Trap® B

Trappola semplice da usare, sicura e specifica per il controllo della mosca delle olive

COMPOSIZIONE
Lambda-cialotrina 0,0075 g pura per trappola

FORMULAZIONE
esca pronta all'uso

NUMERO DI REGISTRAZIONE
17985 del 11.2.22

INDICAZIONI DI PERICOLO
ATTENZIONE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Colture	Parassiti	Dosi trappole / ha
Olivo	Mosca delle olive *(Bactrocera Oleae)* Applicare dallo sviluppo del frutto alla raccolta.	10 - 50

Karate Trap® C

Trappola semplice da usare, sicura e specifica per il controllo della mosca della frutta

COMPOSIZIONE
Lambda-cialotrina 0,0075 g pura per trappola

FORMULAZIONE
esca pronta all'uso

NUMERO DI REGISTRAZIONE
17984 del 11.2.22

INDICAZIONI DI PERICOLO
ATTENZIONE

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Colture	Parassiti	Dosi trappole / ha
Arancia Mandarino Clementine Limone Pomelo Pompelmo	Mosca della frutta *(Ceratitis capitata)* Applicare dallo sviluppo del frutto alla raccolta.	40 - 80
Pesco Nettarine, Albicocco Prugna Ciliegia		50 - 80
Melo Mele cotogne Pero		50 - 80
Vite (uva da tavola e da vino)		50 - 80

KARATE Trap B e KARATE Trap C non fanno parte della linea Syngenta Biologicals

Coprantol® Hi Bio 2.0

Fungicida in granuli idrodisperdibili a base di rame di idrossido. La finezza delle particelle e la qualità del processo produttivo garantiscono un'elevata attività fungicida a basse dosi di impiego e una maggiore prontezza d'azione.
Tali caratteristiche consentono, inoltre, un'attività fungicida e battericida più costante nel tempo, superiore resistenza al dilavamento e una riduzione dei dosaggi di rame.

Coprantol® 30 WG

Fungidica a base di rame ossicloruro in granuli idrodispersibili.
La formulazione evoluta e l'elevata qualità del processo produttivo permettono l'ottimizzazione delle particelle di rame e qiuindi un elevato grado di finezza, garanzia dell'effetto coprente e dell'ottima persistenza di azione.

Coprantol® Trio

Fungicida a base di rame solfato tribasico (TBCS) formulato in sospensione concentrata.
La sua composizione rameica ad azione di contatto garantisce un ottimo grado di copertura, resistenza al dilavamento e costante attività fungicida e battericida.
Grazie alla sua formulazione liquida è pratico da usare e facile da dosare.

Tiovit® Jet

Fungicida a base di zolfo micronizzato in microgranuli idrodisperdibili.

Tiovit® 800 L

Fungicida a base di zolfo in formulazione liquida che grazie alle dimensioni uniformi delle micelle garantisce elevata selettività, ottima adesività, prolungata efficacia, facilità di dosaggio e miscibilità con altri prodotti.

L'innovazione è al centro di tutto quello che Syngenta fa per gli agricoltori. Per questo l'azienda è alla costante ricerca di soluzioni che permettano di utilizzare input innovativi in grado sia di sostenere e difendere le coltivazioni, sia di garantire una **sempre maggiore attenzione alla tutela delle risorse naturali.**
Tra questi input si annoverano i **Biologicals**, categoria che al suo interno comprende un'ampia gamma di prodotti di **ispirazione o derivazione naturale** per proteggere e rafforzare le piante, risultato dell'impegno costante in ricerca e sperimentazione.

I Biologicals sono il risultato dell'innovazione scientifica basata sulla conoscenza della natura e pertanto aprono un mondo di possibilità per il miglioramento della salute delle piante e del suolo e giocano un ruolo fondamentale per il futuro dell'agricoltura sostenibile e rigenerativa, mettendo a disposizione di chi produce nuovi strumenti e rispondendo alle richieste del mercato.

L'offerta Syngenta per i Biologicals include anche prodotti utilizzabili in agricoltura biologica per le principali colture del nostro Paese, dalla vite alle orticole e frutticole, dai cereali al mais e anche al florovivaismo.

Questa pubblicazione è dedicata alle colture speciali quali vite, frutta e orticole.

Syngenta Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi, 280/6 - 20126 Milano
www.syngenta.it

Quanto riportato nel presente documento ha valore puramente indicativo. Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute; per relativa composizione e numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio dei preparati. ® e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta.

syngenta®
Biologicals