

# ACELEPRYN 200 SC

Il tuo partner per il controllo mirato delle larve dannose

 **Acelepryn**<sup>®</sup> 200 SC

syngenta<sup>®</sup>

ACELEPRYN 200 SC è il nuovo insetticida fogliare per il controllo mirato delle larve di coleotteri, inclusa *Popillia japonica* e larve di *Tipula* spp. su tappeti erbosi ornamentali, ricreativi e sportivi (inclusi campi da golf, campi sportivi) e tappeti erbosi per l'inerbimento di colture ornamentali in vivaio in pieno campo.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Controllo prolungato nel tempo per oltre 2 mesi
- Massima efficacia con una singola applicazione
- Attività preventiva su larve di 1° e 2° stadio
- Selettivo per il tappeto erboso
- Rapido blocco dei danni

Ingrediente attivo  
**CHLORANTRANILIPROLE**


Classe chimica  
**DIAMIDI**

 **Acelepryn**<sup>®</sup> 200 SC

Nuovo meccanismo d'azione  
**Modulatore del recettore rianodinico**

Formulazione  
**Sospensione concentrata 200 g/l**

## NUOVO MECCANISMO D'AZIONE



Fase  
**1**

### Esposizione

L'insetto ingerisce il principio attivo contenuto in ACELEPRYN 200 SC

Fase  
**2**

### Attivazione

Il prodotto si lega ai recettori rianodinici nei muscoli dell'insetto e ne determina l'apertura

Fase  
**3**


### Paralisi e morte dell'insetto

Il calcio scorre fuori dai recettori rianodinamici aperti, esaurendo quello necessario per la contrazione muscolare. La conseguente paralisi muscolare porta alla morte degli insetti



## CONTROLLO DI *POPILLIA JAPONICA* CON ACELEPRYN 200 SC

Risultato di 99 prove scientifiche negli USA




Fonte interna

## OTTIENI IL MEGLIO DA ACELEPRYN 200 SC

- Applicare in modo preventivo poichè ACELEPRYN 200 SC è attivo solo su larve di 1° e 2° stadio
- ACELEPRYN 200 SC deve essere applicato appena prima o in concomitanza del picco di volo degli adulti, che coincide con il picco di ovideposizione
- Sfalciare prima di applicare il prodotto
- Dove possibile è consigliabile far seguire al trattamento un'irrigazione, o effettuare il trattamento prima di una pioggia naturale
- Ritardare quanto più possibile gli sfalci dopo l'applicazione del prodotto

## DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Applicare ACELEPRYN 200 SC alla dose di 0,6 l/ha con un volume d'acqua di 500 l/ha.

Composizione	Formulazione	Registrazione	Confezioni	N° applicazioni/anno	Indicazioni di pericolo
Chlorantraniliprole g 18,3 (200 g/l)	Sospensione concentrata	N° 17962 del 04.04.2023	Flaconi da 600 ml	1	ATTENZIONE 

Quanto riportato nel presente documento ha valore prevalentemente indicativo. Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute, a base di chlorantraniliprole 18,30% - n° di registrazione 17962 del 04.04.2023. Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta. © e TM Marchi registrati di una società del Gruppo Syngenta.

 **Acelepryn® 200 SC**

**syngenta**

Il prodotto in Italia è distribuito da:

**ICL** ICL Italia Treviso srl  
Tel. 0422 436331 - [www.icl-sf.it](http://www.icl-sf.it)

Syngenta Italia S.p.A.  
Viale Fulvio Testi 280/6 - 20126 Milano - Tel. 02.33444.1 - [www.syngenta.it](http://www.syngenta.it)