

# MATCH TOP®

Insetticida in emulsione concentrata

## Composizione

100 g di prodotto contengono:

lufenuron puro g 4.43 (50 g/l)

coformulanti q.b. a g 100

Contiene: Polietilenglicole idrogeno solfato monotridecile etere;

Gamma butirrolattone; Dipropilenglicole dibenzoato

## INDICAZIONI DI PERICOLO

**H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.**

**H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata**

EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso



ATTENZIONE

## CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini

P261 Evitare di respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P280 Indossare guanti/ indumenti protettivi

P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:

lavare abbondantemente con acqua e sapone

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente

Syngenta Italia S.p.A.

Via Gallarate, 139 – MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:

SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. 9374 del 29.9.97

Partita n. vedi corpo della confezione

**litri 1**

Altri stabilimenti di produzione:

. SCHIRM GmbH – Schönebeck (Germania)

. SYNGENTA AGRO S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)

. S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S.Lambro (LO)

. SCAM S.p.A., Strada Bellaria, 164, Modena

Altre taglie: ml 100-250-500; litri 5

© marchio registrato di una Società del Gruppo Syngenta

## ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

### PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

Se vengono utilizzati in serra arnie di *Bombus terrestris* per l'impollinazione delle coltivazioni, le arnie devono essere coperte o rimosse dalla serra prima dell'applicazione del prodotto e scoperte o reintrodotte (posizionandole nello stesso punto) non prima di 48 ore dopo il trattamento.

### Norme di sicurezza

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

### Informazioni per il medico

Sintomi aspecifici e rilevati solo su animali da laboratorio con surdosaggi.

“Avvertenza” Consultare un Centro Antiveneni

Match Top è un insetticida ad ampio spettro di azione facente parte della famiglia chimica delle aciluree, a base di lufenuron. Match Top è un inibitore della sintesi della chitina, e il suo meccanismo di azione è specifico per gli insetti. Match Top agisce sugli stadi immaturi degli insetti, come larve e ninfe che producono chitina, mentre non è attivo sulle forme adulte. Match Top agisce principalmente per ingestione. Match Top non possiede attività sistemica. Visto il meccanismo di azione di Match Top, per i lepidotteri il momento ideale di applicazione è dall'inizio al picco dell'ovideposizione, momento determinato mediante l'utilizzo di trappole a feromoni. Match Top è selettivo per gli acari predatori e gli insetti parassitoidi.

### DA IMPIEGARSI SOLO IN SERRA

### Modalità di impiego e dosi

Coltura	Dosaggio di Match Top		N° massimo dei trattamenti e modalità di applicazione
	ml /hl	l/ha	
<b>Parassiti controllati</b>			
<b>Peperone</b> Tripidi: <i>Frankliniella occidentalis</i>	200	2	3 trattamenti a distanza di 7-14 giorni
Nottue: <i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera</i> spp.	100	1	
<b>Pomodoro</b> Tripidi: <i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips tabaci</i>	200	2	3 trattamenti a distanza di 7 - 14 giorni
Nottue: <i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera</i> spp.	100	1	
<b>Zucchino, cetriolo, cetriolino</b> Tripidi: <i>Frankliniella occidentalis</i> , <i>Thrips tabaci</i>	200	2	2 trattamenti a distanza di 7-14 giorni
Nottue: <i>Heliothis armigera</i> , <i>Spodoptera</i> spp.	100	1	
<b>Ornamentali e floricole</b> Tripidi: <i>Frankliniella occidentalis</i> .	200	2	3 trattamenti a distanza di 10 - 14 giorni
Nottue: <i>Heliothis armigera</i> e <i>Spodoptera</i> spp.	100	1	

La dose di Match Top calcolata in base al volume di bagnatura non deve mai risultare inferiore a quella minima raccomandata in litri per ettaro.

Non trattare in fioritura od in coltivazioni con piante spontanee in fioritura, particolarmente in condizioni che favoriscano la deriva del prodotto.

### Compatibilità

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

### Fitotossicità

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

### Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta

Observare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate.

Etichetta autorizzata con D.D. del 27 settembre 2016

**ATTENZIONE**

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

**Etichetta autorizzata con D.D. del 27 settembre 2016**