

AMADEUS® SX®

Granuli idrosolubili - Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di frumento tenero e duro e dell'orzo.

**AMADEUS® SX®
COMPOSIZIONE**

100 grammi di prodotto contengono:
Tifensulfuron metile puro g 33.3
Tribenuron metile puro g 16.7
Coformulanti q. b. a 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Contiene tribenuron metile. Può provocare una reazione allergica (EUH 208). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

CONSIGLI DI PRUDENZA

Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le normative vigenti (P501).

Titolare della Registrazione

Cheminova Agro Italia S.r.l. - Via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo - Tel. 03519904468

Officina di Produzione

Cheminova Agro France SAS, Uffholtz, Francia

Officina di Rietichettatura:

Althaller Italia S.r.l. - Strada Com.le per Campagna 5, 20078 San Colombano al Lambro (MI)

Distribuito da:

Syngenta Italia S.p.A. - via Gallarate 139, 20151 Milano - Tel. 02.33444.1

Registrazione N.16800 del 25.07.2016 del Ministero della Salute

Contenuto netto: g 50-100-200-500 PARTITA N.

**ATTENZIONE****PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

-Non contaminare l'acqua con il prodotto o con il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

-Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

-Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri da vegetazione naturale. In alternativa utilizzare ugelli antideriva ad iniezione d'aria, operando alla pressione di lavoro indicata e comunque non superiore ad 8 bar.

NORME PRECAUZIONALI

Conservare il recipiente ben chiuso. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto

con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Non sono al momento noti casi di intossicazione o di avvelenamento nell'uomo. In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso, se possibile mostrargli l'etichetta.

Terapia: Sintomatica

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118**EPOCA DI IMPIEGO**

Post-emergenza: di frumento tenero e duro e dell'orzo dallo stadio di tre foglie fino allo stadio di botticella della coltura.

AMADEUS SX viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento, AMADEUS SX blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 2 settimane dall'applicazione. Le malerbe non devitalizzate sono drasticamente ridotte nello sviluppo e sono molto meno competitive nei riguardi della coltura. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocità di azione.

Dosi d'impiego: Dosi d'impiego: 50-60 g/ha, con aggiunta di un bagnante a base di olio di colza o di un bagnante non ionico autorizzato alle dosi raccomandate per l'impiego in miscela con erbicidi, da distribuire in 200-400 litri d'acqua; la dose più bassa si applica su infestanti e colture poco sviluppate, la dose più alta nei trattamenti tardivi.

SPETTRO D'AZIONE: Infestanti sensibili: Adonide (*Adonis aestivalis*), Amaranti (*Amaranthus spp.*), Camomilla bastarda (*Anthemis cotula*), Coriandolo (*Bifora radians*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Billeri (*Cardamine hirsuta*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Crisantemo delle messi (*Chrysanthemum segetum*), Erba cornetta (*Consolida regalis*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Geranio (*Geranium dissectum*), Erba ruota (*Lamium amplexicaule*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Miagro liscio (*Myagrum perfoliatum*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Aspraggine (*Picris echioides*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Ravanella selvatica (*Raphanus raphanistrum*), Rapistro (*Rapistrum rugosum*), Romice (*Rumex spp.*), Pettine di Venere (*Scandix pecten veneris*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*), Veccia (*Vicia sativa*). **Infestanti mediamente sensibili:** Fumaria (*Fumaria officinalis*), Stoppione (*Cirsium spp.*), Veronica (*Veronica spp.*), Vilucchio bianco (*Calystegia sepium*), Vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*), Viola (*Viola spp.*).

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

AMADEUS SX, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE: Nell'esecuzione del trattamento utilizzare sempre attrezzature pulite, evitando sovrapposizioni e chiudendo l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione. Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.

Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:

a) Risciacquare completamente ed in modo accurato tutta la superficie interna del serbatoio riempito con almeno il 10% di acqua pulita, controllando la completa rimozione di ogni deposito visibile. Lavare per mezzo di un getto ad elevata pressione la pompa, i filtri e la barra e successivamente fare scolare il liquido di risulta dal serbatoio.

b) Rimuovere i filtri e le ghiera degli ugelli e lavare queste parti separatamente.

c) Ripetere il risciacquo e le operazioni di cui al punto a).

Dopo un trattamento con AMADEUS SX si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.

AVVERTENZE AGRONOMICHE: Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

COMPATIBILITA': AMADEUS SX è compatibile con Agherud Dicamba (s.a. MCPA e Dicamba), Flavos (s.a. Bromoxinil ottanoato), Platform 40 (s.a. carfentrazone etile), Starane (s.a. fluroxipyr), Gralit Max (s.a. fenoxaprop-p-etile) e con Topik (s.a. clodinafop-propargil).

In caso di miscela versare nella botte prima AMADEUS SX e successivamente gli altri formulati.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE – IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

© Amadeus è un marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

© SX è un marchio registrato FMC Corporation o di sue società affiliate

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

AMADEUS[®] SX[®] Granuli idrosolubili Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza di frumento tenero e duro e dell'orzo.	
AMADEUS[®] SX[®] COMPOSIZIONE 100 grammi di prodotto contengono: Tifensulfuron metile puro g 33.3 Tribenuron metile puro g 16.7 Coformulanti q. b. a 100	
INDICAZIONI DI PERICOLO Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Contiene tribenuron metile. Può provocare una reazione allergica (EUH 208). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)	ATTENZIONE
CONSIGLI DI PRUDENZA Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le normative vigenti (P501).	
Titolare della Registrazione Cheminova Agro Italia S.r.l. - Via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo - Tel. 03519904468	
Officina di Produzione Cheminova Agro France SAS, Uffholtz, Francia	
Officina di Rietichettatura Althaller Italia S.r.l. - Strada Com.le per Campagna 5, 20078 San Colombano al Lambro (MI)	
Distribuito da Syngenta Italia S.p.A. - via Gallarate 139, 20151 Milano - Tel. 02.33444.1	
Registrazione N.16800 del 25.07.2016 del Ministero della Salute	
Contenuto netto: g 50-100 PARTITA N.	

**PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE
RIUTILIZZATO. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE
DISPERSO NELL'AMBIENTE**