

# AMADEUS TOP

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo

Granuli idrodispersibili

MECCANISMO D'AZIONE: HRAC B

AMADEUS TOP Registrazione Ministero della Salute n. 15674 del 14/01/2013

## COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Tifensulfuron metile puro | g 50  |
| Tribenuron metile puro    | g 25  |
| Coformulanti q. b. a      | g 100 |



**ATTENZIONE**

## CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via Fratelli Bronzetti, 32/28

24124 Bergamo

Tel. 035 19904468

Distribuito da:

Syngenta Italia S.p.A., via Gallarate 139-20151 Milano. Tel 02-33444-1

**INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.**

**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.**

**PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.**

**REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.**

**CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.**

**SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.**

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene Tribenuron metile. Può provocare una reazione allergica. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

Stabilimenti di produzione:

### SCHIRM GMBH

Mecklenburger Strasse 229 - D-23568 LÜBECK (Germania)

### CHEMINOVA INDIA Ltd

Estate, Panoli - 394116 Ta-Ankleshawar, Gujrat (India)

### SCHIRM c/o LEHNKERING GmbH

Wendessener Strasse 11 c. 38300 Wolfenbüttel, (Germania)

### EXWOLD TECHNOLOGY Limited

Unit 6, Toft's Farm East Industrial Estate Brenda, Hartlepool

TS25 2BS (Regno Unito)

### EXWOLD TECHNOLOGY Limited

Wilton Centre, Redcar, Cleveland, TS10 4RF (Regno Unito)

Contenuto netto: g 50-60-100-120-250

PARTITA N.

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle**

**strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata.**

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Tifensulfuron metile 50% e Tribenuron metile 25% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: TIFENSULFURON METILE: -

**TRIBENURON METILE: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea.**

Terapia: sintomatica

**AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.**

## CARATTERISTICHE

AMADEUS TOP è un erbicida sistemico di post-emergenza. Viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento, AMADEUS TOP blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocità d'azione.

## EPOCA DI IMPIEGO

Il prodotto si impiega in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo contro infestanti a foglia larga.

**DOSI D'IMPIEGO:** 30-50 g/ha da distribuire con 200-400 litri d'acqua dallo stadio di tre foglie fino a quello di botticella delle colture.

È attivo su: Adonide (*Adonis estivalis*) Aglio delle vigne (*Allium vineale*), Amaranto (*Amaranthus spp.*), Camomilla bastarda (*Anthemis cotula*), Coriandolo (*Bifora radians*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Farinello comune (*Chenopodium album*), Geranio (*Geranium dissectum*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Miagro liscio (*Myragrum perfoliatum*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Poligono persicaria (*Polygonum persicaria*), Erba porcellana (*Portulaca oleracea*), Ranuncolo (*Ranunculus acer*), Rapistro (*Rapistrum rugosum*), Romice (*Rumex spp.*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*), Veccia (*Vicia sativa*), Viola (*Viola arvensis*).

Infestanti mediamente sensibili: Stoppione (*Cirsium spp.*), Vilucchio bianco (*Calystegia sepium*), Villucchio (*Convolvulus arvensis*), Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Crisantemo delle messi (*Chrysanthemum segetum*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Pettine di Venere (*Scandix pecten veneris*), Veronica (*Veronica persica*).

Per il controllo di queste infestanti si consiglia di utilizzare le dosi più elevate.

## PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

AMADEUS TOP, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo

l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo e non deve essere conservata in taniche o serbatoi per trattamenti successivi.

## AVVERTENZE AGRONOMICHE

Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

## AVVERTENZE

- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:
  - a) Svuotare il serbatoio; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
  - b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; aggiungere ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
  - c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
  - d) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
  - e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.
- Dopo un trattamento con AMADEUS TOP si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ:** Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

## ATTENZIONE

**Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI  
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA  
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO  
DA NON VENDERSI SFUSO**

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE  
DISPERSO NELL'AMBIENTE  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

# AMADEUS TOP

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero  
e duro e dell'orzo

Granuli idrodispersibili

MECCANISMO D'AZIONE: HRAC B

**AMADEUS TOP** Registrazione Ministero della Salute n. 15674 del  
14/01/2013

## COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto  
contengono:

|                                      | g          | Contenuto netto:   |
|--------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>Tifensulfuron<br/>metile puro</b> | <b>50</b>  | <b>g 50-60-100</b> |
| <b>Tribenuron<br/>metile puro</b>    | <b>25</b>  |                    |
| <b>Coformulanti q.</b>               | <b>g</b>   |                    |
| <b>b. a</b>                          | <b>100</b> |                    |

PARTITA N.



**ATTENZIONE**

## CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via Fratelli Bronzetti, 32/28 - 24124

Bergamo

Tel. 035 19904468

Distribuito da: Syngenta Italia S.p.A., via Gallarate 139-20151 Milano.  
Tel 02-33444-1

**INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi  
acquatici con effetti di lunga durata.**

**CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei  
bambini.**

**PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante  
l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.**

**REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.**

**CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi  
e da bevande.**

**SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo  
alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.**

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH208 Contiene  
Tribenuron metile. Può provocare una reazione allergica. EUH401  
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le  
istruzioni per l'uso.**

Stabilimenti di produzione:

**SCHIRM GMBH** - Mecklenburger Strasse 229 - D-23568 LÜBECK  
(Germania)

**CHEMINOVA INDIA Ltd** - Estate, Panoli - 394116 Ta-Ankleshawar,  
Gujrat (India)

**SCHIRM c/o LEHNKERING GmbH** - Wendessener Strasse 11 c, 38300  
Wolfenbüttel, (Germania)

**EXWOLD TECHNOLOGY Limited**

Unit 6, Toff's Farm East Industrial Estate Brenda, Hartlepool, TS25 2BS  
(Regno Unito)

**EXWOLD TECHNOLOGY Limited** - Wilton Centre, Redcar, Cleveland,  
TS10 4RF (Regno Unito)

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO  
ILLUSTRATIVO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME  
VIGENTI**

**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON  
DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**