

SERRATE®

Granuli idrodispersibili

Diserbante selettivo per frumento tenero, frumento duro e triticale

Composizione

100 g di prodotto contengono:

clodinafop-propargyl puro	g 20
pyroxsulam puro	g 7.5
cloquintocet-mexyl puro (antidoto)	g 7.5
coformulanti q.b. a	g 100



Può provocare una reazione allergica cutanea.

Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

ATTENZIONE



Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non disperdere nell'ambiente.

Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare

abbondantemente con acqua e sapone.

In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

SYNGENTA ITALIA S.p.A.

Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:

TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso,

Torrenieri (fraz. di Montalcino – SI) / Italy

Registrazione Ministero della Salute n. 16065 del 25 settembre 2015

Partita n. vedi corpo della confezione

kg 1

Altre taglie: g 250, 500; kg 5

© marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

Per proteggere le piante acquatiche e gli altri organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 2 metri.

Per proteggere le piante non bersaglio non trattare in una fascia di rispetto di 1 metro con 90% di riduzione antideriva.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Terapia: Sintomatica.

Consultare un Centro Antiveneni.

Caratteristiche

SERRATE è un diserbante selettivo per frumento e triticale da applicare in post-emergenza.

Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristemati delle piante.

Infestanti sensibili

Avena (*Avena spp.*), camomilla (*Matricaria spp.*, *Chamomilla spp.*), coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), senape selvatica (*Sinapis arvensis*), spica venti (*Apera spp.*), veronica (*Veronica spp.*).

Infestanti mediamente sensibili

Attaccamano (*Galium aparine*), camomilla bastarda (*Anthemis arvensis*), camomilla raggiata (*Anacyclus radiatus*), cappellini di salamanca (*Agrostis salmantica*), correggiola (*Polygonum aviculare*), forasacco (*Bromus spp.*), lattuga selvatica (*Lactuca serriola*), loglio (*Lolium spp.*), centocchio dei campi (*Anagallis arvensis*), papavero (*Papaver rhoeas*).

Dosi e modalità d'impiego

Epoca di applicazione:

Post-emergenza con coltura dallo stadio di 3 foglie al secondo nodo del cereale (BBCH 13-32). Per ottenere i migliori risultati si consiglia di intervenire su infestanti ai primi stadi di sviluppo ed in attiva crescita (in particolare per *Bromus spp.*).

Trattare una sola volta all'anno usando le normali attrezzature da diserbo con volumi d'acqua compresi fra 200 e 300 litri per ettaro.

Dosi:

0.25 kg/ha. SERRATE va utilizzato con 1-1,5 l/ha (0,5%) di bagnante Adigor o di altro idoneo bagnante a base olio.

Avvertenze agronomiche

In tutte le applicazioni il prodotto può essere utilizzato una sola volta per anno.

Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, alternare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche alternative di controllo delle infestanti, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

Preparazione della soluzione da irrorare

Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Compatibilità

SERRATE non è miscelabile con dicotiledonici contenenti 2,4D o dicamba che possono portare a un ridotto controllo delle infestanti graminacee.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

AVVERTENZE:

Applicare il prodotto su colture in buono stato vegetativo, non applicare su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per il freddo, ristagni d'acqua o siccità. Effettuare prove di compatibilità prima della miscelazione con altri prodotti.

Si consiglia di rientrare in campo dopo almeno 48h dal trattamento o comunque quando la coltura è completamente asciutta.

Fitotossicità

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

COLTURE IN SUCCESSIONE

In base alle buone pratiche agricole e seguendo la normale rotazione, dopo la raccolta del cereale trattato con SERRATE, non ci sono particolari limitazioni per le colture in successione.

In caso di distruzione accidentale della coltura per avversità meteorologiche, attacchi parassitari ecc. è possibile seminare mais, sorgo o altre graminacee previa lavorazione del terreno.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 1 settembre 2017 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 29/10/2019

syngenta