

TERVIGO®

Nematocida per colture orticole
Sospensione concentrata

Meccanismo d'azione: gruppo 6 (IRAC)

Composizione

100 g di prodotto contengono:

abamectina pura g 1.67 (corrispondenti a 20 g/l)
coformulanti q.b. a g 100

Contiene 1,2-benzisothiazol-3-one e EDDHA-NaFe. Può provocare una reazione allergica.



INDICAZIONI DI PERICOLO
H302+H332 - Nocivo se ingerito o inalato. H373 - Può provocare danni al sistema nervoso in caso di esposizione prolungata o ripetuta. H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.



EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P304+P340 - IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P312 - Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere.
P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

Syngenta Italia S.p.A.

Via Gallarate 139 - Milano - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:

SYNGENTA Production France S.A.S., Usine d'Aigues-Vives (Francia)

Registrazione Ministero della Salute n. 15556 del 11/07/2017

Partita n. vedi corpo della confezione

litri 1

Altri stabilimenti di produzione e/o confezionamento:

Syngenta Crop Protection LLC., Gibson Road, Omaha (USA)
Syngenta Korea Ltd, Iksan Plant, Sukam-dong, Iksan-si Jeonbuk (Republic of Korea)
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)

Stabilimento di confezionamento:

ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

Altre taglie: ml 250 – 500; l 5 - 10

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prescrizioni supplementari

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Indossare i guanti durante la fase di miscelazione/caricamento del prodotto.

Pericoloso per le api e gli altri insetti impollinatori.

Se vengono usate arnie di *Bombus terrestris* per l'impollinazione in serra, queste devono essere ricoperte o rimosse dalla serra prima dell'applicazione del prodotto e reintrodotte non prima di 12 ore dopo il trattamento.

Informazioni per il medico

Nota per il medico: in caso di effetti sintomatici, praticare un trattamento di sostegno a seconda della sintomatologia per mantenere le funzioni vitali.

In caso di intossicazione contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI.

Antidoto: non ci sono antidoti specifici per la tossicità acuta dell'abamectina.

Caratteristiche generali

TERVIGO è un nematocida che agisce per contatto, dotato di azione rapida e persistente. È attivo contro i nematodi galligeni (*Meloidogyne* spp.) che attaccano le colture orticole in serra.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Il prodotto è destinato ad un uso esclusivo in serra con il sistema di irrigazione a goccia o con manichette.

Colture: Pomodoro, melanzana, peperone, cucurbitacee e fagiolino (in serra) contro nematodi galligeni (*Meloidogyne* spp.).

Dose d'impiego: **5 l/ha**.

Pomodoro: Effettuare massimo 6 trattamenti per ciclo di coltura.

Melanzana, peperone, cucurbitacee e fagiolino: Effettuare massimo 4 trattamenti per ciclo di coltura

Iniziare i trattamenti dopo il trapianto. Trattamenti successivi ad intervalli di 10-14 giorni. Utilizzare volumi d'acqua (da 10000 a 20000 l/ha) sufficienti a distribuire il prodotto nella fascia di terreno in cui si sviluppano le radici. Non utilizzare un quantitativo eccessivo di acqua in quanto l'incorporamento a profondità maggiori comporta una riduzione dell'efficacia del prodotto nel controllo dei parassiti.

Avvertenze agronomiche

Prima dell'impiego tarare le attrezzature di applicazione in modo da assicurare la distribuzione della corretta dose di prodotto e il suo incorporamento nel terreno. Al termine dell'applicazione, lavare accuratamente con acqua le attrezzature utilizzate.

Intervallo di sicurezza

Le derrate trattate con TERVIGO possono venire raccolte il giorno stesso dell'applicazione del prodotto.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto va usato da solo

ATTENZIONE

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 11 luglio 2017

syngenta.