

TRAXOS® ONE

Concentrato emulsionabile.

Diserbante selettivo per frumento tenero e frumento duro.

Composizione

100 g di prodotto contengono:

pinoxaden puro	g	3,03	(30 g/l)
clodinafop-propargyl puro	g	3,03	(30 g/l)
florasulam puro	g	0,76	(7,5 g/l)
cloquintocet-mexyl puro	g	0,76	(7,5 g/l)
coformulanti q.b. a	g	100	

Contiene idrocarburi, C10-C13, aromatici, <1% naftalene

INDICAZIONI DI PERICOLO

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Attenzione

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Evitare di respirare la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Indossare guanti/indumenti protettivi.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

Raccogliere la fuoriuscita.

Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.

Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:

SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. 14935 del 18/10/2011

Partita n. vedi corpo della confezione

litri 1

Altri stabilimenti di produzione:

CHEMARK Kft. H-8182 Peremarton-Gyartelep Pf 31, Hungary
LEHNKERING GmbH Wolfenbüttel, GERMANY

Stabilimenti di confezionamento:

ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)

Altre taglie: litri 2-4-5-10-20

© marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dalla zona non coltivata.

Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

pinoxaden 3,03%

clodinafop-propargyl 3,03%

florasulam 0,76%

cloquintocet-mexyl 0,76%

Terapia: Sintomatica. Consultare un Centro Antiveleni.

Caratteristiche

TRAXOS ONE è un diserbante graminicida e dicotiledonicida selettivo per frumento tenero e frumento duro, da applicare in post-emergenza. Il prodotto è assorbito dalle infestanti per via fogliare e traslocato ai tessuti meristemati delle piante.

Spettro d'azione:

Controlla Coda di volpe (*Alopecurus myosuroides*), Capellino dei campi (*Apera spica-venti*), Avena (*Avena* spp.), Loglio (*Lolium* spp.), Falaride o Scagliola (*Phalaris paradoxa*, *Phalaris brachystachys*), Fienarola comune (*Poa trivialis*), Attaccamani (*Galium aparine*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Camomilla comune (*Matricaria chamomilla*), Centocchio (*Stellaria media*), Borsapastore comune (*Capsella bursa-pastoris*), Ruchetta violacea (*Diplotaxis eruroides*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Ravello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Coriandolo puzzolente (*Bifora radians*), Veccia dolce (*Vicia sativa*).

I risultati migliori si ottengono applicando TRAXOS ONE su infestanti in attiva crescita. Non utilizzare su infestanti in stato di stress, l'efficacia potrebbe non essere ottimale.

Dosi e modalità d'impiego

Epoca di applicazione:

Post-emergenza con coltura dallo stadio di 3 foglie fino allo stadio di inizio levata ed infestanti fra lo stadio di 3 foglie e quello di levata (graminacee) o fra lo stadio di cotiledoni e quello di abbozzi fiorali (dicotiledoni).

Trattare una sola volta l'anno usando le normali attrezzature da diserbo impiegando volumi d'acqua compresi fra 100 e 400 litri per ettaro.

Dosi:

0,67 - 1,0 l/ha.

Utilizzare il dosaggio massimo per le applicazioni tardive e in presenza di Loglio (*Lolium* spp.) e Fienarola comune (*Poa trivialis*).

AVVERTENZE AGRONOMICHE

Applicare il prodotto su colture in buono stato vegetativo, non applicare su colture danneggiate da attacchi parassitari o sofferenti per il freddo, ristagni d'acqua o siccità.

Il prodotto contiene un principio attivo inibitore dell'enzima ACCasi ed uno dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

Preparazione della soluzione da irrorare

Riempire la botte per un terzo, aggiungere il quantitativo necessario di prodotto, quindi completare il riempimento della botte con agitatore in funzione. Non lasciare la miscela nel serbatoio più del tempo necessario per la distribuzione.

Compatibilità

TRAXOS ONE non è miscelabile con dicotiledonici contenenti 2,4D o dicamba che possono portare ad un ridotto controllo delle infestanti graminacee.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta. Qualora si renda necessaria la risemina della coltura per avversità climatiche o attacchi parassitari, è possibile seminare frumento, orzo, avena, segale e mais senza attendere alcun intervallo.

Fitotossicità

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 30 dicembre 2015